

Thalpochara rubricosa Snellen, 1880, Tijds. v. ent. 23: 64.

Autoba versicolor: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 227, pl. 21i.

Eublemma versicolor: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 169. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 326.

翅展 20 mm。头与颈板棕色；胸部与前翅浅赭黄色杂黑棕色，前翅基线仅在中脉前现几个黑点，内线、中线及外线前段棕色，内线在亚前缘后黑色波浪形，中线在 6 脉处折角，外线在 7 脉后呈黑色，后半锯齿形，亚端线为一列黑点，一棕色斜条自顶角至中线折角处；后翅色同前翅，中线黑棕色，外线黑色锯齿形，亚端线为一列黑点；腹部浅赭黄色。

寄主 红毛榴莲。

分布 海南；印度，斯里兰卡，马来西亚，菲律宾，印度尼西亚。

紫胶猎夜蛾 *Eublemma amabilis* Moore (图版 XL-18)

Eublemma amabilis Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 54, pl. 150, fig. 12. (斯里兰卡)

Eublemma amabilis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 339. ——Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 223. ——Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 183. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 326.

Prophyria amabilis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 223.

翅展 17—20 mm。头部暗褐色；胸部及腹部乳白色，腹背带浅褐色；前翅乳白色，中部至亚端线带浅红褐色，内线只现 12 个暗点，中线褐色，模糊，外线前段白色，亚端线内侧浅红褐色，波曲，中段折成一角，近达外缘；后翅乳白色带浅红褐色，中室端部有一串黑点，亚端线内侧红褐色，在中褶处有一齿形黑斑，外侧有几个黑点。

幼虫取食紫胶虫。

分布 广西、云南；印度，斯里兰卡，新加坡。

斜线猎夜蛾 *Eublemma latistriga* (Warren) (图版 XL-19)

Autoba latistriga Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 229, pl. 24e. (印度 Khasia 山)

翅展 18 mm。头部与胸部浅红褐色；前翅浅红褐色，基线、内线及中线均不明显，在前缘区可见黑褐色外斜纹，内线波曲，外线锯齿形，7 脉后内斜，环纹、肾纹均无，一黑褐粗线自顶角直线内斜达翅后缘近中部，此线外方色较暗，前缘脉外半有一列白点，亚端线黑褐色，波浪形；后翅浅红褐色，内区有一粗黑褐线，较直内斜；腹部浅红褐色。

分布 海南；印度。