

Eublemma roseana: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 340. —Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 134. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 119.
Porphyrinia roseana: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 221. pl. 22c.

翅展 12 mm。头部白色，触角干褐色，下唇须大部红褐色；胸部白色，前足带有褐色；前翅黄白色，前缘区带有红褐色，中、外线之间除前缘区外带有桃红色，中线粗而模糊，暗褐色，近呈直线内斜，外线暗紫红色，自前缘脉外斜至 7 脉，折角内斜，在 4 脉后内弯，外线外侧衬以白色，顶角有一内斜红褐色纹，亚端区 1—3 脉间有一红褐色条纹，端线红褐色，缘毛白色，端部带有红褐色；后翅黄白色，端半部带有红褐色，端线褐色，缘毛黄白色；腹部黄白色。

分布 广东、海南；印度，斯里兰卡，澳大利亚。

迴猎夜蛾 *Eublemma anachoresis* (Wallengren) (图版 XL-13)

Xanthoptera anachoresis Wallengren, 1863, Wien. ent. Mon. 7: 148. (南非)
Thalpxchares divisa Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 371.
Porphyrinia anachoresis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 220.
Eublemma anachoresis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 131. —Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 431. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

翅展 14 mm。头、胸浅黄色，翅基片大部带红棕色；前翅由一黑色内斜线划界，线内方浅黄色，约占翅长之 1/3，线外方桃红色，前缘脉基部附近有一黑点，外侧另一黑点，肾纹仅现二黑点，外线褐色，在中褶及亚中褶处稍内弯，亚端线白色，外侧有一列黑点，与端线相距甚近，在前缘脉后及 2—5 脉间外弯，端线细，桃红色，缘毛褐色，基部桃红色，近端部有一白线；后翅淡黄色，端区带有褐色，端线褐色；腹部黄色带有褐灰色。

分布 广西、云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，大洋洲，非洲。

涡猎夜蛾 *Eublemma cochylioides* (Guenée) (图版 XL-14)

Micra cochylioides Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 2: 245. (留尼汪)
Porphyrinia cochylioides: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 220.
Eublemma cochylioides: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 133. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

翅展 12 mm。头部淡黄色，触角浅褐色；胸部淡黄色，前翅近中部有一内斜褐色条，其内方区域淡黄色，外方至亚端线均带桃红色，外线褐色，不明显，自前缘脉外斜至 6 脉近达亚端线，在 4 脉后强内斜，亚端线褐，前半段有一列黑点，后半段内侧有黑纹，在 2、3 脉后有白纹，顶角有一黑褐色斜纹，缘毛白色微带褐色；后翅淡黄色带有

褐色，近外缘色较浓，缘毛白色；腹部黄褐色，腹面黄白色。

分布 台湾、云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，大洋洲，非洲。

桃红猎夜蛾 *Eublemma amasina* (Eversmann) (图版XL-15)

Anthophila amasina Eversmann, 1842, Bull. Mosc. 3: 555. (Orenburg)

Anthophila paradisea Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 199.

Porphyrinia amasina: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 265, pl. 51f. —Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 147.

Eublemma amasina: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 150. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 130. —Sugi, 1981, in Inoue, Moths Jap. 1: 807. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

翅展 17—25 mm。头部淡黄色，下唇须外侧桃红色；胸部淡黄色，中足胫节桃红色；前翅淡赭黄色，中线至亚端线之间大部带桃红色，前缘区近基部桃红色，中线白色，内侧衬淡褐色，不明显，在中褶与亚中褶处均外凸，外线不明显，暗褐色，自前缘脉外弯至 4 脉后内斜，前段外方有一淡黄色斑，亚端线白色。稍有间断，前段有几个小黑点，在 7 脉处外凸，中段外弯，缘毛桃红色；后翅褐色，缘毛黄色，端部桃红色；腹部淡褐黄色。

寄主 菊科。

分布 黑龙江、河北、陕西、江苏、湖北；朝鲜，日本，欧洲。

紫猎夜蛾 *Eublemma purpurina* (Denis et Schiffermüller) (图版XL-16)

Noctua purpurina [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien p.88. (奥地利)

Porphyrinia purpurina: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 266. —Forster et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 253.

Eublemma purpurina: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 160. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

翅展 21 mm。头、胸及前翅黄白色，前翅带有紫色，但不及基部和大部分端区，中线弱，桃红色，折角于中室下角，外线紫红色，在 4 脉后内斜，亚端线为一列黑齿斑，后半段为线状，外线与亚端线间带有暗灰色，3—7 脉间有一列深紫色纵纹并少许黑点，端线紫红色；后翅白色，端区微褐；腹部浅褐色，基部几节背面白色。

寄主 田蓟。

分布 内蒙古、新疆；亚洲西部，欧洲。

幻猎夜蛾 *Eublemma versicolor* Walker (图版XL-17)

Autoba versicolor Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., Zool. 7: 58. (Sarawak)