

雄蛾抱器瓣稍窄，中段较粗，除抱钩外多无其他突起物。

种 检 索 表

1. 雄蛾前翅外区有 4 沟	二红猎夜蛾 <i>Eublemma dimidialis</i>
雄蛾前翅外区无 4 沟	2
2. 雄性前翅近顶角有一沟	四线猎夜蛾 <i>E. quadrilineata</i>
雄蛾前翅正常	3
3. 前翅有中线	4
前翅无中线	11
4. 前翅各线前端成三角形斑	5
前翅各线前端不成斑	灰猎夜蛾 <i>E. arcuinna</i>
5. 中线直线内斜	6
中线不成直线	8
6. 前翅内半黄，外半紫红	迴猎夜蛾 <i>E. anachoresis</i>
前翅赭白，中区带红色	7
7. 前翅外线在前缘后折角	涡猎夜蛾 <i>E. cochylioides</i>
前翅外线外弯	泛红猎夜蛾 <i>E. roseana</i>
8. 中线外弯	桃红猎夜蛾 <i>E. amacina</i>
中线不外弯	9
9. 中线在前缘后微折角	紫猎夜蛾 <i>E. purpurina</i>
中线在前缘后强折角	10
10. 前翅外线波浪形	幻猎夜蛾 <i>E. versicolor</i>
前翅外线大部内斜	聚猎夜蛾 <i>E. ragusana</i>
11. 前翅有内线	网纹猎夜蛾 <i>E. reticulata</i>
前翅无内线	12
12. 前翅乳白色	紫胶猎夜蛾 <i>E. amabilis</i>
前翅非乳白色	13
13. 前翅一黑褐线自顶角内斜	斜线猎夜蛾 <i>E. latistriga</i>
前翅无黑褐斜线	淡缘猎夜蛾 <i>E. leucanides</i>

二红猎夜蛾 *Eublemma dimidialis* Fabricius (图版 XL-9)

Phalaena dimidialis Fabrcicius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 224. (India Orientali)
Anthophila secta Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. p. 249.
Polycrycta dimidialis: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 260.
Eublemma secta: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 77.
Eublemma dimidialis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 326.

翅展 20—26 mm。头、胸浅黄色；前翅内半淡黄色，外半桃红色，在翅近中部斜行分界，分界处前端外方有一暗点，雄蛾外区在前缘脉与 5 脉之间有 4 条纵沟，亚端线绿褐色，带状，自 7 脉内斜至后缘，缘毛端部白色；后翅黄白色，端区带有褐色，臀角处带有桃红色，缘毛端部白色，臀角处缘毛带有桃红色；腹部淡黄色，第 2 节背面有一桃红色斑。

分布 浙江、湖北、湖南、台湾、福建、海南；日本，印度，斯里兰卡，印度尼西亚，大洋洲。

四线猎夜蛾 *Eublemma quadrilinata* (Moore) (图版 XL-10)

Thalpochares quadrilinata Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 370, pl. 38, fig. 14. (印度)

Eublemma quadrilinata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 343. —Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 79, text fig. 37.

Glyphora quadrilinata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 217, pl. 22b.

翅展 20 mm。头部与胸部乳白色微带紫褐色；前翅乳白色，布有紫褐细点，端区大部带红褐色，内线白色，内侧衬褐色，近直线内斜，中线色同内线，近直线内斜，前端微折角，外线白色，内侧衬褐色，自前缘脉外斜至 7 脉折角内斜，亚端线弱，白色，外侧有细黑点，中段外弯，7 脉前内凹；后翅黄白色，外线褐色，自中室至翅后缘，端区带有褐色，端线褐色；腹部乳白色微带紫褐色。

分布 四川；印度，波斯湾地区，非洲。

灰猎夜蛾 *Eublemma arcuinna* (Hübner) (图版 XL-11)

Phalaena Noctua arcuinna Hübner, 1790, Beitr. Ges. Schmett. 2 (4): 93. (德国)

Eublemma arcuinna: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 114. —Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 251. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

翅展 27—29 mm。头、胸浅褐灰色；前翅灰褐色，内线、外线黑色波浪形，内线前端黑点状，外线外侧衬灰白色，中线黑褐色，外侧衬白色，内侧模糊黑色，亚端线微白，内侧衬黑色，与外线间有一黑色波浪形线，不清晰，端线为一列黑长点；后翅黑褐色，中线黑色模糊，外线仅前半可见，亚端线白色模糊，端线黑色，内侧 3、4 脉间一黑褐斑；腹部浅褐灰色。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、河北、陕西、山东；朝鲜，亚洲西部，欧洲。

泛红猎夜蛾 *Eublemma roseana* (Moore) (图版 XL-12)

Thalpochares roseana Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 370. (印度)

Thalpochares roseana: Butler, 1889, Ill. Het. Het. Br. Mus. 7: 66, pl. 130, fig. 3.