

网纹猎夜蛾 *Eublemma reticulata* Hampson (图版 XL-20)

Eublemma reticulata Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 516. (斯里兰卡)

Eublemma reticulata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 179, pl. 154, fig. 4. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

Autoba reticulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 228, pl. 22k.

翅展 15 mm。头部与胸部棕色微带紫色，颈板与头部杂有灰色；前翅棕色带有淡紫色，中区色较暗，带有紫棕色，前缘区并带有黑色，内线灰白色，外侧衬以暗褐色，自前缘脉外斜至中室前缘，折角直线内斜，肾纹只现一暗褐色点，衬以灰白色，外线灰白色，自前缘脉强外斜至 6 脉折角内斜，在 4 脉后稍内弯，外线外方的前缘脉上有一列白点，间以黑色纵纹，亚端线由一系列间断的黑点组成，前端的黑点与顶角的双齿形白纹相间，缘毛紫棕色；后翅棕色，基部较灰白，中线与外线灰白色，仅后半可见，亚端线由间断的黑点组成，端区色较红棕，缘毛紫棕色；腹部背面淡褐色，各节间白色。

寄主 紫胶虫。

分布 广西；斯里兰卡。

淡缘猎夜蛾 *Eublemma leucanides* Staudinger (图版 XL-21)

Thalpochara leucanides Staudinger, 1889, Stett. ent. Zeit. p. 55. (吉尔吉斯)

Porphyria leucanides: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 269.

Eublemma leucanides: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 189, pl. 154, fig. 20. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 119.

翅展 13 mm。头部与颈板白色，下唇须外侧带有褐灰色，胸部背面淡褐色，下胸白色；前翅淡黄褐色，前缘区淡褐黄色，成一纵条，向顶角渐窄，翅外缘内侧有一列不整齐的黑点；后翅白色，端区微带褐色，端线黄褐色，缘毛白色；雌蛾前翅前缘区白色，后翅带有暗褐色；腹部白色。

分布 新疆；中亚地区。

聚猎夜蛾 *Eublemma ragusana* (Freyer) (图版 XL-22)

Anthophila ragusana Freyer, 1845, Neur. Beitr. 5: 92. (意大利)

Porphyria ragusana: Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 266.

Eublemma ragusana: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 176. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 325.

翅展 18 mm。头与颈板褐黄色；胸部黄白带灰色；前翅黄白带浅褐色，前缘区白色，中线前端黑色，后半褐色，外线双线，前端黑色，在 7 脉处折角，外侧衬白色，后半双线相距渐远，亚端线为一系列黑点，顶角处点较大并有一棕色斑，线内侧另一白色细

线，端线褐色；后翅黄白微带浅褐色，隐约可见亚端线；腹部黄白带灰色。

分布 河北、山东；日本，印度，不丹，缅甸，印度尼西亚，亚洲西部，大洋洲，非洲，欧洲。

裴夜蛾属 *Perynea* Hampson

Perynea Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 201.

Type-species: *Rivula subrosa* Butler.

喙发达，下唇须斜向上伸，第三节小，平伸，额有尖锥形突，复眼大，触角线形；胸部主要被鳞片，胫距长；前翅顶角稍尖，有一副室，后翅5脉发达。

赭灰裴夜蛾 *Perynea ruficeps* (Walker) (图版XL-23)

Thermesia ruficeps Walker, 1864, J. Linn. Soc. Lond., Zool. 7: 186. (Sarawak)

Thermesia sparsa Walker, 1864, J. Linn. Soc. Lond., Zool. 7: 186. p. 187.

Corgatha castaneiceps Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 519.

Sophia ruficeps: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 257, pl. 23k.

Corgatha ruficeps: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 294, pl. 157, fig. 8. —Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 206.

翅展 20 mm。头部与颈板红棕色，胸部淡赭灰色杂有深棕色，前足前缘及中足胫节带有红棕色，跗节暗褐色；前翅淡赭灰色，带有暗棕色并布有黑色细点，内线深棕色，大波浪形外弯，后半弱，肾纹黑色，由3个黑点组成，外线灰色，自前缘脉外弯至4脉前，折向内斜，外区前缘脉上有一列黄灰点间以暗褐纹，亚端线灰色，稍间断，衬以黑褐色，在亚中褶处稍内弯，翅外缘有一列黑点，缘毛暗棕色；后翅淡赭灰色带有暗棕色，横脉纹为一黑点，外线灰色，内侧衬以暗棕色，较直，亚端线灰色间断，翅外缘有一列黑点，缘毛暗棕色；腹部淡赭灰色杂有深棕色。

分布 四川；日本，斯里兰卡，马来西亚。

蝠夜蛾属 *Lophoruza* Hampson

Lophoruza Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 225.

Type-species: *Lophoruza vacillatrix* Hampson.

Eugnathia Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 271.

Lophograpta Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达到或超出头顶，第三节长或中常，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部几全被鳞毛，无毛簇；腹部有一列小毛簇；前翅顶角较