

有一模糊黑棕线，亚端线白色，端区浓褐色；后翅褐白色；腹部浅褐色。雄蛾抱器瓣宽，左右异形，抱钩棘形，阳茎细（图 503）。

分布 黑龙江、内蒙古、湖北；日本，朝鲜，欧洲。

希夜蛾 *Eucarta amethystina* (Hübner) (图版 XXXIII-24)

Noctua amethystina Hübner, 1803, Eur. Schmett. Noct. pl. 14. fig. 69. (欧洲)

Eucarta amethystina: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 781. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 267.

翅展 30 mm。头、胸紫红带暗褐色；前翅紫红带棕色，基线黑色，内线暗棕色，剑纹仅端部可见，外侧一黑纹伸达外线，环纹及肾纹有棕色环，两纹后端一紫红纹相连，两纹间黑棕色，外线双线黑棕色，亚端线粉红色，内侧黑棕色，端线粉红色；后翅棕褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣宽，左右异形，抱钩短，阳茎小（图 504）。




图 504 希夜蛾 *Eucarta amethystina* (Hübner) ♂ 外生殖器

寄主 野胡萝卜、前胡属。

分布 黑龙江、湖北；日本，朝鲜，欧洲。

纹希夜蛾 *Eucarta fasciata* (Butler) (图版 XXXIII-25)

Raphia fasciata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 193. (日本横滨)

Eucarta fasciata: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 781.

翅展 32 mm。头、胸灰色杂黑、褐色；前翅黄灰色。内半大部黑褐色，基线、内线均双线黑色，后者线间白色，后半内方为黄灰色区，剑纹为一黑条伸达外线，剑纹至中室间带有白色，环纹大，白色黑边，肾纹内缘可见黑色，中线模糊，外线为一列黑点，亚端线不显；后翅浅褐色，端区色暗；腹部褐灰色。

分布 吉林；日本。