

前翅外线在亚中褶处不外突 戎恭夜蛾 *E. munita*

齿恭夜蛾 *Euclidia dentata* Staudinger (图版LIV-23)

Euclidia glyphica var. *dentata* Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 573. (Ussuri; Bureja; Amur 地区)

Gonospileia dentata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 52. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 344, pl. 62k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 359.

Ectypa dentata: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 166.

翅展 31—40 mm。头部与胸部赭褐色，下胸与足褐黄色；前翅棕褐色，外线外方灰黄褐色，内线为一深棕色外斜条，前端尖，向后渐宽，约呈三角形，其外缘后角止于 1 脉，中线棕色，自前缘脉至中室后缘折角波浪形外斜，肾纹椭圆形，深棕色，外围浅褐色，外侧有一黑棕色三角形斑，外线双线深棕色，线间黄色，自前缘脉外弯，至 6 脉后内斜 3 脉后外突，外线后半与内线之间深棕色，外线前段外方有一深棕色砧形斑，端线深棕色，波浪形，端区色较暗，缘毛红褐色；后翅内半暗棕色，外半暗黄色，有一黑棕色亚端带，其中段较粗，端区带有暗棕色，缘毛红褐色；腹部黄色，背面暗棕色。

分布 黑龙江、内蒙古；日本。

三角恭夜蛾 *Euclidia triquetra* (Denis et Schiffermüller) (图版LIV-24)

Noctua triquetra [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 95 (奥地利)

Noctua fortificata Fabricius, 1787, Ent. Syst. 3 (2): 52.

Phalaena fascialis Villers, 1789, Ent. Linn. 2: 450.

Gonospileia triquetra: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 13: 53. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 134.

Ectype triquetra: Forster et al., 1971, Schmett. Mitteleur. p. 291.

翅展 33 mm 左右。头部与胸部暗褐色带灰色；前翅灰色，杂有黑褐色，外半部带褐黄色，前缘脉黑色，内区有三角形黑斑，其前端达亚前缘脉，其后缘微内凹，不达翅后缘，肾纹暗褐色，斜椭圆形，外侧衬淡黄色，外线黄白色，至 6 脉处内斜，至 4 脉折向内至 3 脉近基部再折向外斜，在 2 脉折角内斜，线内方暗褐色，与肾纹间形成一近三角形大斑，在肾纹后成一斜方大斑，亚端线白色，微曲内斜，前端内侧有一齿形黑斑，其后为暗褐窄带，端线黑色，缘毛暗褐色，端区翅脉白色，后翅橘黄色，中室、亚中褶及后缘区杂褐色，亚端线黑褐色，较粗，在中褶处微外弯，后端达臀角，端线黑色，缘毛黑褐色。

寄主 黄芪。

分布 新疆；土耳其，欧洲。