

检视标本：1♀，江西庐山，1974. VI. 17；1♂1♀，福建崇安星村三港，740 m，1960. VI. 12；2♂1♀，福建武夷三港，1983. VI. 5、14；1♂，广西龙胜百岩，1150 m，1963. VI. 19。

分布：江西、福建、广西、四川；日本。

拟长翅祉尺蛾 *Eucosmabraxas pseudolargetaui* (Wehrli, 1933) (图版 XV: 22)

Calleulype pseudolargetaui Wehrli, 1933, Int. ent. Z. 27: 38. (华西)

Eucosmabraxas pseudolargetaui: Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 107, pl. 10: h.

前翅长：♂22 mm。体色和斑纹极似长翅尺蛾 *Obeidia largeraui* Oberthür (灰尺蛾亚科 Ennominae)。但结构特征完全不同。体黄色，背中线两侧排列黑斑。前翅桔黄色，斑点深褐色；基半部散布数个小斑点；中点略大；外线及其外侧的斑点和亚缘线近似绣球祉尺蛾。后翅基半部白色，端部桔黄色；基部有两个小斑点，其外侧为两条带，粗细不均；翅端部为两列褐斑，其中内侧一列斑块较大。翅反面颜色、斑纹与正面相同。

雄性外生殖器 (图 638)：阳茎基环侧突特别粗大，端部毛束较长。抱器瓣较暗祉尺蛾和弥斑祉尺蛾略窄。阳茎粗大。

检视标本：1♂，重庆万县王二包，1200 m，1993. VII. 3。

分布：四川、云南。

备考：本种及下一种构成长翅尺蛾属 (*Obeidia*) 十分有趣的拟态。本种是命名者在 *Obeidia largeraui* Oberthür 的标本之中发现的，而下一种的定名人则直接将其命名为 *Obeidia* 属之一种 (属名误拼为 *Obedia*)。

双环祉尺蛾 *Eucosmabraxas octoscripta* (Wileman, 1912)

Obedia octoscripta Wileman, 1912, Entomologist 45: 169. (台湾：阿里山)

Eucosmabraxas octoscripta: Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 107.

前翅黄色，后缘附近基部 2/3 白色；基部 1/3 有 3 列黑点；中域近前缘处有两个巨大“8”字形黑纹；外线为一列 9 个黑点，第四至第六个最小，第七和第八个最大，后者位置较靠内侧，偏离黑点列；亚缘线为一列 7 个黑点，第二个分裂为二；缘线黑色，缘毛黄色与黑色相间。后翅白色，近基部处有黑点；端部 1/3 黄色，其上有两列黑色斑点。翅反面同正面。

未见标本。以上译自 Wileman 原记。

分布：台湾。