

足胫节近基部有一白点；前翅红棕色，翅脉有黑褐点，亚中褶基部带有暗绿色，内线浅褐色，内侧衬黑褐色，自前缘脉直线内斜达翅后缘近基部，环纹与肾纹不显，后者或可见浅褐色边，外线浅褐色，自前缘脉强内斜至翅后缘内半，在2—6脉间稍外弯，顶角尖，翅外缘斜，中段稍拱曲，翅后缘中部凹，使后缘近基部及臀角各成一后突齿；后翅黄色，外区4脉后有一黑色曲条，端区有一黑色宽带，其前端扩展至前缘区中部，后端止于2脉，其内缘大部波曲，外缘锯齿形，其外侧的缘毛有一列黑色斑；腹部污黄色。

分布 海南；马来西亚，斯里兰卡，印度尼西亚，印度支那半岛，印度。

凡艳叶夜蛾 *Eudocima fullonica* (Clerck) (图版LVI-8)

Phalaena fullonica Clerck, 1764, Icones, pl. 48. (未注明模式产地)

Ophideres fullonica: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 560. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 361. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363.

Othreis fullonica: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 36. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 106.

翅展93—96 mm。头、胸及前翅赭褐色，前翅翅脉有细黑点，基线、内线黑褐色，较直，肾纹不明显，外线微曲内斜，内线、外线之间暗褐色，亚端线微黄，自顶角直线内斜，后半不明显，中段外侧带暗绿色；后翅橘黄色，中部一黑曲条，端区一黑宽带，前端内展近翅基部，后端达2脉，内缘锯齿形；腹部褐黄色。

寄主 木通。成虫吸食多种水果的果汁。

分布 黑龙江、山东、江苏、浙江、湖南、台湾、福建、广东、海南、广西、四川、云南；日本，朝鲜，大洋洲，非洲。

木夜蛾属 *Hulodes* Guenée

Hulodes Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 207.

Type-species: *Phalaena caranea* Cramer.

Hylodes Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 46.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，雄蛾下唇须第三节小，雌蛾中常，触角线形；胸部及腹部被粗毛，胫节无刺，雄蛾胫节、中足第一跗节及后足有长毛；前翅前缘在顶角处拱曲，顶角较尖弯，后翅中室约为翅长的1/3。

种 检 索 表

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 前翅外线与亚端线间有数条波浪形线····· | 悦木夜蛾 <i>Hulodes hilaris</i> |
| 前翅外线与亚端线间不明显····· | 木夜蛾 <i>H. caranea</i> |