

Cutworms agric. reg. China p. 75, text fig. 41. —Varga *et* Ronkay, 1987, Acta zool. Hung. 33 (1—2): 212.

翅展 39mm。头顶黑灰色；胸部灰褐色；前翅浅褐灰色，散布细黑点，基线、内线及外线均双线黑色，亚端线灰色锯齿形，内、外线在 1 脉后相遇，剑纹大，环纹斜，肾纹大，内线外方的中室黑色，肾纹有四条楔形黑纹，在 2、3 脉间有一黑斑；后翅白色；腹部浅褐灰色。雄蛾抱钩基部亦细，阴茎有一弹头形小角状器（图 137）。




图 137 肾棘昭夜蛾 *Eugnorisma eminens* (Lederer) ♂ 外生殖器

分布 新疆；中亚地区。

谐昭夜蛾 *Eugnorisma chaldaica* (Boisduval) (图版 X-24)

Orthesia chaldaica Boisduval, 1840, Gen. Ind. Meth. p. 140. ("Russia Moridionale")




图 138 谐昭夜蛾 *Eugnorisma chaldaica* (Boisduval) ♂ 外生殖器

Eugnorisma chaldaica: Boursin, 1954, Bonn. zool. Beitr. 5: pl. 11, fig. 53. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 285. —Varga et Ronkey, 1987, Acta zool. Hing 33(1—2):203.

翅展 37mm。头、胸浅红棕色杂灰色；前翅浅灰褐色，基线、内线及外线均双线黑棕色，亚端线灰色，剑纹前缘可见白色，环纹与肾纹黄白色，两纹间黑色，环纹内侧一足形黑棕纹，中线隐约可见黑棕色；后翅白色；腹部浅赭色。雄蛾抱钩基部肥，阴茎有一小角状器（图 138）。

分布 新疆；俄罗斯。

断线昭夜蛾 *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus) (图版 X-25)

Phalaena Noctua depuncta Linnaeus, 1761, Fn. Suce. p. 321. (瑞典)

Noctua mendosa Hübner, 1803, Schmett. Eur. Noct. pl. 26, fig. 120.

Eugnorisma depuncta: Boursin, 1954, Bonn. zool. Beitr. 5: 254. —Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 77.

翅展 41mm。头部黄白色；胸部灰色杂黑褐色；前翅灰褐色，基线与中线黑色，内线双线，内一线灰色，外一线黑色，外线双线黑色，亚端线灰白色，剑纹圆形，环、肾纹褐灰色，后者大，后端越出中室；后翅白色；腹部赭灰色。雄蛾抱钩短粗，阴茎无角状器（图 139）。




图 139 断线昭夜蛾 *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

寄主 荨麻、报春、酸模等。

分布 新疆；欧洲。

沁夜蛾属 *Rhyacia* Hübner

Rhyacia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 210.