




图 194 化图夜蛾 *Eugraphe subrosea* (Stephens) ♂ 外生殖器

色，亚端线锯齿形，内侧褐色扩展；后翅浅褐黄色；腹部褐色。雄蛾抱器瓣腹缘端部强凹，抱钩粗，端尖，阳茎端部有具齿的脊（图 194）。

寄主 杨梅、柳、桉木属。

分布 黑龙江；欧洲。

隐图夜蛾 *Eugraphe obsoleta* Chen (图版 XII-18)

Eugraphe obsoleta Chen, 1986, Acta ent. Sin. 29 (3): 312. (西藏樟木)




图 195 隐图夜蛾 *Eugraphe obsoleta* Chen ♂ 外生殖器

Eugraphe obsoleta: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.103, text fig. 58.

翅展 29mm。头部淡褐色；胸部背面黑褐色；前翅淡赭黄色，中室色较暗，各横线不明显，环纹大，近圆形，深褐色，肾纹轮廓不清，翅端区有二模糊黑褐线，波浪形，端区翅脉黑色间有少许白色，各翅脉间有一黑点；后翅暗灰色，缘毛淡赭黄色；腹部暗褐色。

雄性外生殖器的钩形突粗而长，端部尖，抱器瓣宽，端部尖，瓣腹缘近端部微外突，抱钩粗壮折曲，端部尖，阳茎端基环宽扁，端部平，阳茎粗大，端膜上方有一群小锯齿形突，内囊无角状器（图 195）。

分布 西藏。

捷图夜蛾 *Eugraphe praecipua* (Staudinger) (图版 XII-19)

Agrotis praecipua Staudinger, 1892, Iris, 5: 360, pl. 3, fig. 5. (蒙古)

Episilia praecipua: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 499, pl. 73, fig. 18.

Chersotis praecipua: Chen, 1986, Cutworms agric. reg. China p. 87.

翅展 37mm。头部红褐色；胸部浅褐黄色；前翅浅褐灰色，翅脉纹微黑，各翅脉间有暗褐纵线，前缘区及中脉前后色浅，各横线不显，中室黑色，亚中褶一黑纵纹，环纹斜椭圆形，黑边，肾纹窄，浅褐黄色黑边，亚端线隐约可见，衬黑褐色；后翅浅褐黄色；腹部褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、青海、新疆；蒙古。

本种与漫卡夜蛾外形相似，但后者前翅翅脉衬白色。

烽图夜蛾 *Eugraphe funkei* (Püngeler) (图版 XII-20)

Agrotis funkei Püngeler, 1901, Dtsch. ent. Z., Lep. 1901, 14: 181, pl. 2, figs. 1—2. (新疆)

Lycophotia funcei Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 542, pl. 74, fig. 23.

Rhyacia funkei: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 53, pl. 12i.

Triphaena funkei: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR. 13: 157.

翅展 36mm。头部与胸部灰色，密布黑色细点，下唇须外侧灰黑色，足跗节黑色，各节间有灰白斑；前翅褐灰色，密布黑细点，基线双线黑色，自前缘脉至亚中褶，有间断，内线双线黑色，在前缘区较粗外斜，其后微波浪形，剑纹较小，黑边，环纹圆形，中有褐圈，肾纹中有褐曲纹，环纹与肾纹之间及环纹至内线间的中室黑色，肾纹外侧中部有一黑纵纹外伸至亚端线，外线双线黑色，细锯齿形，自前缘脉后外弯至 4 脉，其后内弯，亚端线褐灰色，内侧衬暗褐色及一系列黑色锯齿形纹，在 7 脉处外凸，2—5 脉间外弯，翅外缘有一列新月形黑点；后翅白色带褐色，翅脉及端区褐色，缘毛白色，中有一褐线；腹部褐灰色。