

一褐黑斑；腹部黄色，端部几节背面带黑褐色。

分布 海南；印度，斯里兰卡。

锯缘夜蛾属 *Eugrapta* Wileman et South

Eugrapta Wileman et South, 1917, Entomologist 50: 146.

Type-species: *Eugrapta igniflua* Wileman et South.

Eugrapta Hampson, 1926, Descr. New Gen & Spec. Noct. Br. Mus. p. 544. (preoccupied)

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，第三节长，额光滑无突起，雄蛾触角线形，有鬃毛和纤毛；胸部背面几乎只被鳞片，前胸有小毛簇，后胸有大毛簇；前翅顶角尖，外缘在4脉处成一尖突，其后波曲内斜，有一副室；后翅外缘波曲，在4、7脉处以及2、3脉处各成一尖齿，中室长约为翅长之1/3，5脉发达，自中室下角略前发出。

锯缘夜蛾 *Eugrapta igniflua* Wileman et South (图版 LXV-29)

Eugrapta igniflua Wileman et South, 1917, Entomologist 50: 145. (日本)

Eugrapta igniflua: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 873.

翅展32 mm。头部与胸部赭黄色杂红棕色及少许黑色；前翅浅褐色微带紫灰色，内线为一黄棕色窄带，自前缘脉外斜至中室前缘折角内斜，1脉后外斜，线内方色暗，环纹只现一黑点，中线不明显，微黑，肾纹窄长，新月形，暗灰色，内外缘黑色，外侧有一红棕色斑，外线黄白色，自前缘脉外斜至4脉折角内斜，外侧的中褶处有一浅黄纹，亚端线不明显，微黑，间断为点纹，线内方的前缘脉上有一列黄白点，近翅外缘有一列黑点，翅外缘中部外突成一钝角；后翅色似前翅，中线微黑，不明显，横脉纹黑色，外线黄白色，在3—4脉处外弯，后端外侧有一近圆形黑斑，亚端线微黑，不清晰，后半断为点列，亚中褶及2—3脉间的点较粗，近翅外缘有一列黑点；腹部浅褐色。

分布 福建、广西；日本。

坦夜蛾属 *Tamba* Walker

Tamba Walker, 1869, Charac. undescr. Lep. Het. p. 94.

Type-species: *Tamba submicacea* Walker.

Obdora Walker, 1869, Charac. undescr. Lep. Het. p. 95.

喙发达，下唇须向上伸，第二节超过头顶，第三节较长，雄蛾触角线形，胫节有毛簇；雄蛾腹部较长；前翅较宽，外缘中部凸；后翅宽，外缘波斜，臀角处稍平削，后缘较短。