




图 709—710 雄性外生殖器。709. 束带游尺蛾 *Euphyia azonaria* (Oberthür);
710. 中弦游尺蛾 *E. mediovittaria* (Moore)

1973. VI. 12; 1 ♂, 西藏察隅桑久, 3 000 m, 1973. VI. 25。

分布：西藏；锡金，克什米尔地区。

束带游尺蛾 *Euphyia azonaria* (Oberthür, 1893) (图版 XVI: 29)

Somatina azonaria Oberthür, 1893, Études d'Ent. 18: 32, pl. 4: 50. (华西)

Cidaria azonaria: Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 648.

Cidaria (Euphyia) azonaria: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 246, pl. 9: b.

Euphyia mediovittaria azonaria: Prout, 1939, ibidem 12: 281

前翅长：♂ ♀ 14—16 mm。颜色较浅，前翅带明显黄褐色调；中带较前种狭窄，深褐色，中部或多或少有灰褐色斑，黑色中点极微小；中线浅弧形微波曲，外线中部的凸齿较前种更为短钝，齿尖至外缘的距离与外线在 R_5 处至外缘的距离相等；外线外侧带黄褐色，浅色带较直，亚缘线白色锯齿状，通常连续，其附近颜色略灰。后翅颜色浅淡，斑纹模糊不清，有时可见深灰色中点。

雄性外生殖器（图 709）：背兜较瘦小。抱器背端突较前述两种长，抱器瓣狭窄，端部的小瓣狭窄但明显延长。

雌性外生殖器（图 713）：囊颈处的骨化带粗大，下端螺旋形；囊片近似亚角游尺蛾。




图 711—714 雌性外生殖器. 711. 亚角游尺蛾 *Euphyia subangulata* Kollar; 712. 亚东游尺蛾 *E. goniodes* Prout; 713. 束带游尺蛾 *E. azonaria* (Oberthür); 714. 中弦游尺蛾 *E. mediovittaria* (Moore)

检视标本：8 ♂ 5 ♀，云南丽江玉龙山，1962. VII. 21—VIII. 3；1 ♂ 1 ♀，同前，2 800—2 850 m，1984. VII. 15、20；1 ♂，云南云龙天池，2 500 m，1982. VIII. 9；2 ♂ 1 ♀，云南云龙志奔山，2 430—2 600 m，1981. VI. 20、21；1 ♂，云南维西，2 920 m，1981. VII. 18；1 ♂，云南泸水姚家坪，2 500 m，1981. VI. 4；1 ♂，云南宾川鸡足山，2 250 m，1982. VI. 14。

分布：云南。

中弦游尺蛾 *Euphyia mediovittaria* (Moore, 1868) (图版 XVI: 30)

Coremia mediovittaria Moore, 1868, Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 656. (印度：大吉岭)

Cidaria mediovittaria: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 356.

Euphyia mediovittaria: Prout, 1939, in Seitz, Macrolepid. World 12: 281, pl. 27: 1.

前翅长：♂ ♀ 14—15 mm。前翅中线浅弧形，几乎不波曲，其内侧颜色较暗，内线模糊；中带下半部特别狭窄，外线在 R_5 以下呈反弧形，中部不凸出，中带中部的灰斑通常清晰，有时可伸达后缘，具微小黑色中点；翅端部大部深灰色，邻近外线处灰白色或灰黄色，但深灰色在前缘附近扩展至外线；亚缘线为一列细小短条状白点。后翅灰白