

前翅长: ♂ 15 mm。前翅基部至中线颜色无明显变浅, 近似灰游尺蛾的情况; 外线中部凸齿较长, 端部钝圆; 外线外侧的白色带较窄, 带有浅灰褐色。后翅灰褐色, 波状外线外侧有一条灰白色带, 带上有一条极细弱的伴线。

检视标本: 1 ♂, 四川南坪九寨沟, 2 400 m, 1983. IX. 7。

分布: 四川。

同角游尺蛾 *Euphyia coangulata* (Prout, 1914) (图版 XVI: 23)

Cidaria (*Euphyia*) *coangulata* Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 247. (蒙古)

Euphyia coangulata: Prout, 1939, ibidem 12: 281.

前翅长: ♂ ♀ 15—16 mm。头和胸部背面深褐至黑褐色, 掺杂白色鳞片, 下唇须腹面、领片、后胸后缘和第一腹节前缘白色, 腹部其它部分深灰褐色。前翅斑纹近似灰游尺蛾, 但外线外侧的白色带特别狭窄, 十分鲜明, 带上有一条模糊细线; 亚缘线白色波状, 较完整, 无局部扩展。后翅白色, 除微弱深灰色中点外几乎无斑纹。前翅反面隐见正面斑纹, 黑色中点同正面。后翅反面中点较正面略清晰, 有时可见波状外线及亚缘线残迹。

雄性外生殖器 (图 700): 钩形突侧缘直立, 顶端中部浅凹, 两下角向背兜侧面延伸, 后者短宽。囊形突较短。抱器瓣特别狭长, 腹缘中部明显隆起。阴茎细小, 端膜无刺, 阴茎盲囊端部的小突指状。

雌性外生殖器 (图 703): 囊导管下端增粗, 与囊体无明显界限。囊体较小, 囊片不规则圆形, 弱小。

检视标本: 2 ♂ 1 ♀, 西藏古江达, 3 400 m, 1976. VII. 26、31。

分布: 四川、西藏; 俄罗斯, 蒙古。

双突游尺蛾 *Euphyia ochreata* (Moore, 1888)

Larentia ochreata Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson: 267. (印度: 大吉岭)

Cidaria ochreata: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 352.

Cidaria (*Euphyia*) *ochreata*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 247.

Euphyia ochreata: Prout, 1939, ibidem 12: 281.

分布: 湖北、湖南、四川、云南; 印度。

中国分布下述亚种。

暗褐亚种 *subsp. brunneimixta* (Thierry-Mieg) (图版 XVI: 24)

Cidaria picata var. *brunneimixta* Thierry-Mieg, 1915, Misc. ent. 22: 47. (云南: 大理)

Cidaria picata Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 640. (nec Hübner, [1813] 1796)