

*Euplexia literata*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 759.

翅展 40mm。头、胸及前翅黄绿带褐色，前翅基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线间带黑色，剑纹微黑，环纹及肾纹褐黄色，肾纹后有一黄绿色齿形纹，中室大部黑色，亚端线黄色二曲，外侧在中褶与亚中褶各一黑纹；后翅黄白或浅褐色，端区色或较暗；腹部灰黄带暗褐色。

**分布** 江苏、浙江、湖北、湖南、江西、海南、云南；日本，锡金，印度。

### 霉锦夜蛾 *Euplexia olivacea* (Moore) (图版 XXX-4)

*Berrhaea olivacea* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 357. (大吉岭)

*Trachea olivacea*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 144. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 139.

翅展 40mm。头、胸及前翅霉绿色带红褐色，前翅内线、外线间带黑褐色，翅脉带黑色并有细白点，基线、内线均双线黑色，前者锯齿形，后者波浪形，外斜，剑纹不显，环、肾纹黄绿色，后端一黄绿纹相连并扩展至中室后，2脉基部后有一白斑，中线、外线黑色，后者锯齿形，亚端线黄绿色，在 1—4 脉成外突齿，外侧中褶处一黑斑；后翅基部微白，其余浅黑褐色；腹部暗褐色。

**分布** 西藏；锡金。

### 黄尘锦夜蛾 *Euplexia aurigera* (Walker) (图版 XXX-5)

*Berrhaea aurigera* Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1721. (印度)

*Trachea aurigera*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 148. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 255.

翅展 40mm。头、胸褐色，头顶黄绿色；前翅黄绿带褐色，中段大部带黑色，基线，内线及外线均双线黑色，内线波浪形，外线锯齿形，基线后的 1 脉前后各一黑纹，环纹、肾纹有不完整黑边，后端相连并扩展至 2 脉基部，其后另一黄绿纹，后端微白而内钩，中线黑色，亚端线黄绿色，在 3、4 脉为齿形；后翅褐色，中室及其后黄白色；腹部浅褐灰色。

**分布** 云南、西藏；锡金，印度。

### 滴纹锦夜蛾 *Euplexia guttata* Warren (图版 XXX-6)

*Euplexia guttata* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 140, pl. 17g. (锡金；不丹)

*Euplexia guttata*: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 259. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 250.

翅展 42mm。头部与胸部褐绿色杂黑色及少许白色，下唇须第一、二节外侧黑色，颈板中部有一黄白色横纹；前翅褐绿色带黑色，翅脉上有白色细点，基线双线黑色，线

间黄色，自前缘脉至亚中褶，内线暗绿色，波曲外斜，环纹与肾纹苔绿色，中央稍黑，两纹后端相通，后方有一白色斜圆形小斑，外线黑色，锯齿形，自前缘脉后外弯，至4脉后内斜，亚端线绿色，不规则波浪形，在3、4脉处稍外凸，端线由一系列黑点组成；后翅黄白色，前缘区及翅外半带有褐色；腹部浅褐色，基部背面毛簇黑色。

**分布** 西藏；不丹，锡金。

### 黄绿锦夜蛾 *Euplexia chlorerythra* Swinhoe (图版XXX-7)

*Euplexia chlorerythra* Swinhoe, 1895, Trans. ent. Soc. p. 41. pl. 1, fig. 6. (印度)

*Euplexia chlorerythra*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 231. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 141.

翅展28mm。头、胸白色，前胸黑色；前翅白色，内线内方带褐红色，前、后缘区带黑色，外线内方带绿褐色，基线黑色间断为点列，亚中褶处一黑V形纹，内线白色，前端外侧一黑点，剑纹仅端部现二黑点，环纹、肾纹白色，边缘有黑点，两纹间黑色，外线为黑点列，前端为半圆形大黑点，亚端线黑色锯齿形，内方一红棕宽带，端区翅脉微黑；后翅与腹部黄白带褐色。

**分布** 湖南；印度，锡金。

### 绣锦夜蛾 *Euplexia picturata* (Leech) (图版XXX-8)

*Agrotis?* *picturata* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 33. (中国西部: Chia-kou-ho, Huang-mu-chang)

*Euplexia picturata*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 231. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 189.

翅展26mm。头、胸白色；前翅白色带褐黄色，基线、内线、中线及外线均黑色，在前缘脉为点状，其后多有间断，基线外方一红褐曲带，前、后端黑色，剑纹只现一黑点，环纹、肾纹白色，两纹间黑色，亚端线赤褐色，7脉前为漏斗形黑斑，其后锯齿形并间断，2脉端有一黑斑，臀角一红褐斑；后翅与腹部黄白色，后翅可见外线与亚端线。

**分布** 四川、云南。

## 驳夜蛾属 *Karana* Moore

*Karana* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 106.

Type-species: *Karana decorata* Moore.

*Yula* Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 193.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部。第三节短，额平滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，头部与胸部被鳞片，头顶有鳞脊；前、后胸有散开形毛簇；