

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节超过头顶，第三节长，额光滑无突起，上部有尖毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，有鬃毛；胸部背面几乎全被鳞片，无毛簇；前翅顶角尖，有一副室；后翅中室长约为翅长之半，5脉发达，自中室下角发出。

甸夜蛾 *Eurogramma obliquilineata* (Leech) (图版 LX-26)

Talapa? obliquilineata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 646. (峨眉山)

Talapa obliquilineata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 412.

翅展 50 mm。全体灰褐色；前翅内线褐色，微曲内斜，在中室前不显，环纹只现一黑褐点，中线粗，红褐色，近呈直线内斜，外线褐色，细弱，近呈直线内斜，线外侧 6—7 脉间有一黑褐色粗点，顶角稍外突而尖；后翅中线粗，红褐色，直线内斜，外线细，褐色，与中线近平行。

分布 四川（峨眉山、紫经泗坪）。

畸夜蛾属 *Bocula* Guenée

Bocula Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 295.

Type-species: *Bocula caradrinoides* Guenée.

Borsippa Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1756.

Lacibisa Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc. zool. 7: 82.

Eudragana Butler, 1888, Proc. zool. Soc. p. 545.

Aramuna Moore, 1884, Lep. Ceyl. 3: 35.

Sillophora Warren, 1912, Nov. zool. 19: 54.

Trichoptya Warren, 1912, Nov. zool. p. 53.

喙发达，下唇须细，向上伸，约达头顶，第三节短小；胸部被平滑鳞片，足胫节饰毛，雄蛾触角线形，或有纤毛丛；雄蛾前翅反面或有一鳞丛；后翅反面或有大鳞丛，腹部较长，常有长毛簇。

种 检 索 表

1. 前翅反面中脉处密鳞成块状 黄畸夜蛾 *Bocula pallens*
前翅反面中脉处无密鳞 2
2. 前翅端部暗色斑内缘弧形 完斑畸夜蛾 *B. divergens*
前翅端部暗色斑内缘波曲 3
3. 前翅中线单线 角斑畸夜蛾 *B. microscala*
前翅中线双线 齿斑畸夜蛾 *B. quadrilineata*