



图 599—600 雄性外生殖器. 599. 焦褥尺蛾 *Eustroma ustulata* Xue, sp. nov.;
600. 西南褐褥尺蛾 *E. melancholica brunnearia* Leech

1 260—1 300 m, 1993. VI. 20—21, 1994. V. 6、IX. 12; 1 ♂, 四川峨眉山,
1 800—1 900 m, 1957. VII. 28; 2 ♂, 同前, 800—1 000 m, 1957. IX. 16、19。

分布: 陕西、湖北、台湾、四川。

褐褥尺蛾 *Eustroma melancholica* (Butler, 1878)

Cidaria melancholica Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 450. (日本)

Eustroma melancholica: Leech, 1897, ibidem (6) 19: 565.

分布: 台湾、四川; 日本, 俄罗斯, 锡金。

中国分布下述两个亚种。

西南亚种 subsp. *brunnearia* Leech, 1897 (图版XV: 21)

Eustroma melancholica f. *brunnearia* Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 565. (四川)

Eustroma melancholica brunnearia: Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 106, pl.
10: g.

前翅长: ♂ 23—24 mm, ♀ 25 mm。额和头顶黄色, 掺杂褐鳞, 额中央有一个小褐斑。下唇须深褐色, 第一节腹面和第二节至端部背面黄色。胸部背面灰褐至深褐色, 侧面在翅基上方和背中线黄色, 中胸背面立毛簇发达。腹部背面灰褐色, 背中线色稍浅,