

内白文夜蛾 *Eustrotia semialba* (Hampson) (图版 XLII-7)

Metachrostis semialba Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 332. (缅甸)

Eustrotia semialba: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 604, pl. 166, fig. 30. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 123.

Pseudeustrotia semialba: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 289.

翅展 25 mm。头部白色，下唇须第 2 节外侧黑褐色，触角褐色；胸部背面白色，足胫节与跗节外侧带有褐色；前翅白色，顶角区自前缘脉中部至臀角前的端区带有红褐色，前缘区基部褐色，中室后缘近基部有一褐色点，肾纹仅在中室下角现一褐色小斑，肾纹前方有一暗褐色斜纹，外线褐色，不明显，自前缘脉外斜至 6 脉，折角内斜，在 1 脉处稍外凸，前端外方有一近三角形褐斑，其内缘有白点，翅外缘内侧有一列黑点，缘毛暗褐色；后翅黄白色带褐色，端区色暗，近外缘有一列黑点，自前缘至亚中褶；腹部白色，背面带有赭色。

分布 广西；缅甸，锡金。

淡文夜蛾 *Eustrotia bankiana* (Fabricius) (图版 XLII-8)

Pyralis bankiana Fabricius, 1775, Syst. ent. p. 645. (英国)

Tortrix olivana [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 126.

Eustrotia olivana: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 580. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 332.

Deltote bankiana amurula: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 814.

翅展 23 mm。头、胸及前翅浅绿褐色，头、胸杂有白色及少许黑色，前翅有黑色细点，前缘脉基部有一银白色纵条，内线为一白色外斜窄带，其内缘较直，外缘微波曲，中室后渐窄，外侧在中室后有黑点，或中室后亦有一黑点，外线为一白色外斜窄带，向后渐窄，伸达臀角，其内缘在中室处向内突，或成为一斑点于中室下角，前缘区近顶角有一白色内斜纹，亚端线直，白色，接近白色端线，缘毛白色杂有褐色，近基部有一暗褐细线；后翅白色带有褐色，缘毛白色，近基部有一暗褐细线，端部有暗褐色鳞；腹部白色，布有黑褐细点。

寄主 早熟禾等。

分布 黑龙江、内蒙古、新疆、江苏；欧洲，伊朗等。

清文夜蛾 *Eustrotia candidula* (Denis et Schiffermüller) (图版 XLII-9)

Noctua candidula [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett, Wien. p. 89. (奥地利)

Eustrotia candidula: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 581. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 281. —Chen, 1982, Icon. Het. 3: 332.

Pseudeustrotia candidula: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 820.

翅展 20 mm。头、胸白色杂少许褐色；前翅白色，基线、内线及外线均双线黑色，基线外侧一大黑褐斑，内线后端内侧有黑褐纹，环纹为二黑点，肾纹灰色白边，周围有小黑斑，内侧一褐斜条伸至前缘脉，外侧及前方亦褐色，外线锯齿形，外侧 6 脉处一黑斑，亚端区一浅褐带，前宽后窄，波曲，前缘有白斑点，端线为一列黑点；后翅浅褐色，外线褐色，后翅浅褐黄色。

分布 黑龙江、新疆；日本，朝鲜，蒙古，土耳其，欧洲。

黑带文夜蛾 *Eustrotia plumbicilia* Draudt (图版 XII-10)

Eustrotia plumbicilia Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 139, pl. 8, fig. 30. (四川巴塘)

Eustrotia plumbicilia: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 331.

翅展 20 mm。头部与胸部灰褐色；前翅淡褐色微带黄色，中部有一黑褐色带，其前段内缘微曲，内侧另有一细褐线与之平行，外区有一褐色楔形纹，前宽后窄，后半微曲，亚端线波曲，其中段内侧黑褐色，外侧大部黑褐色；后翅暗褐灰色；腹部灰褐色。

分布 四川。

小文夜蛾 *Eustrotia noloides* (Butler) (图版 XII-11)

Acontia noloides Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 366. (日本)

Eustrotia noloides: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 583, pl. 166, fig.

1. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 281, pl. 52f. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 332.

Neustrotia noloides: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 819.

翅展 15—20 mm。头部白色杂有暗褐色，额白色，下唇须外侧暗褐色，触角褐色；胸部白色杂暗褐色，翅基片白色，足跗节外侧褐色，各节间有白环；前翅白色，前缘区近基部有一褐色三角形斑，中区有一界限不清的黑带，其后半带有黑色，其内缘在中室处明显内突，其后内斜至 1 脉，肾纹只现二黑点，有微白圈，后一点较大，外线褐色，外侧衬白色，自前缘脉后外斜至 6 脉，在中褶处内凸，4 脉后明显内弯，在 1 脉处外凸，外区前缘有一褐斑，中褶及后缘区各有一模糊灰褐斑，前缘脉上有三个白点，亚端线白色，内侧衬褐色，7 脉后及中段外弯，线外方中段带褐色并有一列粗黑点，缘毛褐色，臀角处外缘毛白色；后翅淡褐色，基部色浅，端线暗褐色，缘毛白色；腹部褐色。

分布 江苏；日本。

暗边文夜蛾 *Eustrotia marginata* (Walker) (图版 XII-12)

Earias marginata Walker, 1866, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 35: 1775. (爪哇)