

*Earias marginata*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 612. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 293. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin, 3: 332.

翅展 18—20 mm。头部赭黄色，触角、额下部及唇须深褐色；胸部背面赭黄色，下胸前部、前足深红褐色，中、后足带有红褐色；前翅赭黄色，端区为一紫褐色带，其内缘黑色，不规则波浪形，稍内弯，亚中褶近中部有一黑点；后翅白色带有褐色；腹部黄色带有褐色。

**寄主** 莎草科。

**分布** 广东；印度，缅甸，印度尼西亚。

### 奥文夜蛾 *Eustrotia ozarbica* Hampson (图版 XLII-13)

*Eustrotia ozarbica* Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 602, pl. 166, fig. 28. (印度)

*Eustrotia ozarbica*: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 140.

翅展 23 mm。头部与胸部暗褐色带灰色，下胸微白，足跗节外侧黑色，各节间有白斑；前翅褐色带紫灰色，内线双线黑褐色，在中室前缘折角，其后微外斜，环纹不显，肾纹窄，黑褐色，中线模糊，黑褐色成带状，外线双线黑褐色，线间黄白色，在前缘脉后折角，其后直线后行，外侧有一黄白窄带，内侧的中褶处有一黑点，外区前缘脉上有一列黄白点，亚端线黄白色，细弱，稍外弯，3脉后内弯，缘毛端部黄白色；后翅灰褐色，缘毛端部黄白色；腹部暗褐带灰色。

**分布** 江苏；印度。

### 臂斑文夜蛾 *Eustrotia costimacula* Oberthür (图版 XLII-14)

*Erastria costimacula* Oberthür, 1880, Et. ent. 5: 83, pl. 4, fig. 4. (Askold 岛)

*Eustrotia costimacula*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 603. —Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 201, pl. 52k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 322.

*Neustrotia costimacula*: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 820.

翅展 18 mm。头部与颈板褐色杂有少许白色，胸部背面白色杂有少许褐色；前翅白色带有赤褐色，布有少许黑色细点，前缘基部较白，前缘区近基部有一黑纹，紧接一黑色三角形巧克力色斑，内线在前缘脉上为一黑点，其后为黄白色两侧衬褐色细弱线，前缘区近中部有一大三角形褐斑，其后部黑色，中室端部有一白边的三角形斜斑，外线白色，自前缘脉沿褐斑内斜至 9 脉，外弯至 4 脉，再内斜，外线外方的前缘脉有黑褐色纵纹间以白点，亚端线隐约可见白色，内侧为黑褐细点，端线白色，缘毛白色带褐色；在翅尖处色较深；后翅淡褐色，端线深褐色；腹部背面白色带褐色。

**分布** 黑龙江、湖北；日本，俄罗斯。