

Type-species: *Hadena indistans* Guenée.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，头部与胸部主要被鳞片，头顶有鳞脊，前、后胸有分裂型毛簇，足胫节饰长毛；腹部背面有一列毛簇，雄蛾腹端部外均被有锈褐色鳞片；前翅宽，有一副室；后翅5脉微弱，自中室横脉中下部发出。雄蛾前、后翅反面的前半部2/3被有锈褐色鳞片。

种 检 索 表

1. 前翅暗褐色 2
 前翅褐灰色 东尤夜蛾 *Eutamsia asahinai*
2. 肾纹两侧有白点 斑尤夜蛾 *E. siderifera*
 肾纹仅外侧有白点 聚尤夜蛾 *E. confundens*

东尤夜蛾 *Eutamsia asahinai* Sugi (图版 XXIX - 17)

Eutamsia asahinai Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 762, pl. 187, figs. 21, 22; pl. 364, fig. 4. (日本)

Eutamsia asahinai: Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.980.

翅展 34mm。头、胸、腹及前翅褐灰色，前翅各横线黑褐色双线，内线、外线波浪形，剑纹大，环纹及肾纹有不完整的黑边，两纹间黑色，亚端线细弱，双线间微白，内侧一列黑齿纹，外侧亦有黑齿纹于3—6脉间；后翅微褐。雄蛾抱器瓣端半部肥大，抱钩棘形（图 472）。




图 472 东尤夜蛾 *Eutamsia asahinai* Sugi ♂ 外生殖器

分布 湖南、福建、海南；日本。