

**聚尤夜蛾 *Eutamsia confundens* (Walker)** (图版 XXIX-18)

*Hadena confundens* Walker, 1857, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 11: 757. (斯里兰卡)

*Hadena confundens*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3:

*Condica confundens*: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 218.

翅展 37mm。头、胸红褐色；前翅暗褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线波浪形，外线锯齿形，剑纹近长方形，暗褐色，环、肾纹黄褐色，后者外侧有白点，中线黑色波浪形，亚端线赭黄色锯齿形，中段内侧一列黑齿纹；后翅黄白，外半带褐色；腹部褐色。

**分布** 江西、海南、西藏；印度，斯里兰卡。

**斑尤夜蛾 *Eutamsia siderifera* (Moore)** (图版 XXIX-19)

*Hadena siderifera* Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 357. (印度)

*Trachea siderifera*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 202. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 256

*Condica siderifera*: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 218.

*Eutamsia siderifera*: Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p.532.

翅展 46mm。头、胸褐色带紫色；前翅褐色，基线、内线及外线均双线黑色，基线、内线锯齿形，外线波浪形杂锯齿形，剑纹大，近方形，环纹及肾纹褐色，环纹前端有二白点，肾纹外半有一白圆斑，斑前后各一白点，内缘中央一黑点，前后各一白点，前端二白点间有一白弧形，中线黑棕色，亚端线浅褐黄色，两侧有黑纹；后翅与腹部褐色。

**分布** 江西、福建、云南；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，非洲。

**道夜蛾属 *Antapamea* Sugi**

*Antapamea* Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 743.

Type-species: *Apamea conciliata* Butler.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，额光滑无突起，复眼大，圆形，头、胸主要被鳞片，头顶有鳞脊、前、后胸有分裂型毛簇，足胫节饰长毛；腹部背面有一列毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉微弱，自中室横脉中下部发出。

**道夜蛾 *Antapamea conciliata* (Butler)** (图版 XXIX-20)

*Apamea conciliata* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 84. (日本)

*Trachea conciliata*: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 177.