

滑尾夜蛾 *Eutelia blandatrix* Hampson (图版 XLII-39)

Eutelia blandatrix Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 48, pl. 175, fig. 8. (中国; 日本)

Eutelia blandatrix: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 141. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 335.

Phlogophora blandatrix: Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 174—175.

翅展 30 mm。头与颈板浅红褐色; 胸部黑棕色; 前翅褐色杂灰色, 后缘外半黄色, 翅脉白色, 基线双线白色, 基线粗, 白色, 自中室起分为三根线, 肾纹中央白色, 前后端淡褐色, 后端稍内突, 外侧一白斑达外线, 外线四条, 内双线黑色衬白, 线间褐色, 在 6—7 脉及 2—4 脉间血红色, 后端有一蓝黑斑, 外双线黑色衬白色, 与内双线近平行, 亚端线白色波浪形, 中段间断并衬以黑色, 端线为一列衬白的黑点, 只达 2 脉, 缘毛褐色, 各脉端的缘毛黑色; 后翅白色, 翅脉黑色, 亚端区有一黑带, 其后端有白点, 端区前半黑色, 2、3 脉端有红褐色斑, 端线为一列黑点; 腹部黑棕杂灰色。

分布 浙江、湖南、海南、四川、云南; 日本。

异尾夜蛾 *Eutelia diapera* Hampson (图版 XLII-38)

Eutelia diapera Hampson, 1902, J. Bomb. Nat. Hist. Soc. 14: 210. (不丹)

Eutelia diapera: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 51, pl. 175, fig. 11. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 356.

翅展 22 mm。头、胸褐黑杂灰色; 前翅灰白色, 大部带褐色, 基部一褐黑斑, 近三角形, 内线双线黑色直线内斜, 环纹、肾纹黄白色, 中线红褐色, 在中室为长方形黑斑, 外线双线红褐色, 外方另一黑褐粗线, 内侧红褐色, 亚端线白色锯齿形, 后段外方白色为主, 前段外方一扭角形红褐纹, 中有黑齿纹, 端线黑褐色; 后翅暗红褐色, 基部黄白色; 腹部褐灰, 基部几节背面黑褐色, 第三节有二黄白条。

分布 云南; 不丹。

钩尾夜蛾 *Eutelia hamulatrix* Draudt (图版 XLII-40)

Eutelia hamulatrix Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 140, pl. 8, fig. 31. (西天目山)

Eutelia hamulatrix: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 335.

翅展 31—33 mm。头部及胸部黑色杂灰白色; 前胸背面有褐色, 前翅灰白色, 密布黑色细点, 基线黑色外弯至中室, 内线双线黑色, 微外弯, 环纹白色黑边, 肾纹白色黑边, 中有褐纹, 外线双线黑色, 在 6 脉成外突齿, 在 3、4 脉稍外突, 后半外侧白色及褐色, 亚端线双线白色, 内一线大波浪形外斜至 3 脉端部, 内侧 3—5 脉间为一新月