

幼虫腹足俱全，前2对较短宽，在土茧中化蛹，蛹两端较钝。

种 检 索 表

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. 雄蛾触角双栉形 | 漆尾夜蛾 <i>Eutelia geyeri</i> |
| 雄蛾触角非双栉形 | 2 |
| 2. 雄蛾触角锯齿形 | 3 |
| 雄蛾触角线形，较扁 | 白点尾夜蛾 <i>E. stictoprocta</i> |
| 3. 前翅外缘波曲，至3脉后内斜 | 4 |
| 前翅外缘直，至3脉后凹曲 | 环尾夜蛾 <i>E. vittalba</i> |
| 4. 前翅中室有鳞扇 | 志尾夜蛾 <i>E. favillatrixoides</i> |
| 前翅中室无鳞扇 | 5 |
| 5. 第四腹节背面有白斑 | 6 |
| 第四腹节背面无白斑 | 7 |
| 6. 前翅顶角一白斑 | 鹿尾夜蛾 <i>E. adulatricoides</i> |
| 前翅顶角无白斑 | 滑尾夜蛾 <i>E. blandiatrrix</i> |
| 7. 前翅外线前端有黑纹 | 异尾夜蛾 <i>E. diapera</i> |
| 前翅外线前端无黑纹 | 钩尾夜蛾 <i>E. hamulatrix</i> |

漆尾夜蛾 *Eutelia geyeri* (Felder et Rogenhofer) (图版XLII-33)

Eurhipia geyeri Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 11p, fig. 23. (日本)

Eutelia inextricata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 147.

Eutelia inextricata: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 32. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 788. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 335.

翅展 35 mm。头、胸褐色杂灰色，一白线横越翅基片及胸背；前翅褐色带枯黄，基线、内线均双线白色，肾纹白色，前半一褐斑，外线双线黑色，前半波曲，后半波浪形内斜，内一线后端一黑斑，内侧中褶处有双黑纹，4脉至后缘一红棕带，亚端线白色，中段间断并衬黑色，端线为一列衬白的黑点，3、4脉端的黑点合成一斜斑纹；后翅白色微褐，外线褐色，亚端区一暗褐宽带，端线双线暗褐色；腹部暗褐色。

寄主 盐肤木。

分布 江苏、浙江、湖南、江西、福建、四川、云南、西藏；日本，印度。

白点尾夜蛾 *Eutelia stictoprocta* Hampson (图版XLII-34)

Eutelia stictoprocta Hampson, 1895, Trans. ent. Soc. Lond. p. 304. (锡金)

Eutelia stictoprocta: Hampson, 1896, Fn. Br. Ind. 4: 529.

Phlegetonia stictoprocta: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 79, pl. 176, fig. 2. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 360. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn.