

Icon. Het. Sin. 3: 316.

翅展 42mm。头、胸赭褐色；前翅浅黄褐带锈褐色，1脉基部前有一褐纹，基、内线均双线褐色，前者波浪形，后者锯齿形，剑纹褐色，环纹大，肾纹中常，中线前段可见褐色，锯齿形，外线黑色锯齿形，外侧衬浅黄色，亚端线浅黄色，内侧衬赤褐色，端区翅脉暗褐色；后翅浅褐黄色，翅脉带赤褐色，外线暗褐色波曲；腹部黄褐色。

**分布** 新疆、西藏；中亚地区。

## 漫冬夜蛾属 *Bryotype* Hampson

*Bryotype* Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 382.

Type-species: *Euplexia mesomelana* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，前缘饰毛，第三节短，额平滑无突起，眼大，圆形；头部与胸部主要被鳞，前胸有分裂的毛簇，后胸有散开形毛簇，足胫节有毛；腹部基节背面有毛簇；前翅有副室，后翅 6、7 脉共柄。

### 高漫冬夜蛾 *Bryotype flavipicta* (Hampson) (图版 XXVI-8)

*Eurois flavipicta* Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 228. (锡金)

*Bryotype flavipicta*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 382. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 111. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 109. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.207.

翅展 35mm。头、胸灰色杂红褐及黑褐色；前翅灰色带褐色，翅脉黑色，1脉基部前有一黑纹，其前外方黄白色，基线双线黑色，内线黑色内侧衬白，波浪形，剑纹后一黑纹伸至外线，环纹斜方形，黄褐色，肾纹内半黄褐色，外半白色，外线黑色锯齿形，外侧衬白色，亚端线黄色，内侧衬红褐色；后翅暗褐色，可见外线；腹部褐色。

**分布** 西藏；锡金。

## 友冬夜蛾属 *Euxenistis* Warren

*Euxenistis* Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 140.

Type-species: *Hadena amicina* Staudinger.

喙发达，下唇须斜向前伸，第二节下缘饰长毛，第三节细小，额与头顶有粗毛，雄蛾触角双栉形，额光滑无突起，复眼大，圆形；前、后胸有散开形毛簇，足胫节饰毛；腹部基部背面有毛簇；前翅外缘波曲，有一副室，后翅 6、7 脉共柄。

### 友冬夜蛾 *Euxenistis amicina* (Staudinger) (图版 XXVI-9)

*Hadena amicina* Staudinger, 1895, Iris, 8: 322. (青海湖与罗布泊之间)

*Blepharidia amicina*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 394.

*Euxenistis amicina*: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 140. —Nye, 1975, Lepid. Cat. Noct. 1—2: 205.

*Blepharosis amicina*: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.218.

翅展 35mm。头部与胸部褐色带有黑灰色；前翅暗褐色，中区及端区微黑，外区较灰，基线灰色，两侧衬黑色，自前缘脉外斜至 1 脉，二曲形，内线灰色，两侧衬黑色，波浪形外斜，环纹斜椭圆形，灰色黑边，中有暗褐色环，肾纹色似环纹，稍长，外线灰色，内侧衬黑色，自前缘脉锯齿形外弯，4 脉后内斜，外区前缘脉上有一列灰白点，亚端线三曲形，内方灰色，外方暗褐色，端线黑色，缘毛基部有一褐白线；后翅褐色，端线黑色，缘毛基部有一褐白线；腹部暗褐色，臀毛簇色浅。

分布 青海、西藏。

## 雅冬夜蛾属 *Gaurenopsis* Houlbert

*Gaurenopsis* Houlbert, 1921, Et. Lep. Comp. 18: 232.

Type-species: *Gaurenopsis velutina* Houlbert.

喙发达，下唇须向上伸，第二节饰长毛，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇；腹基节背面有毛簇；前翅有一副室；后翅 6、7 脉短共柄，5 脉弱。

### 雅冬夜蛾 *Gaurenopsis conspicua* (Leech) (图版 XXVI-10)

*Polia conspicua* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 94. (康定)

*Gaurenopsis velutina* Houlbert, 1921, Et. Lep. 18: 232.

*Blepharidia conspicua*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 399. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 141.

翅展 38mm。头、胸、前翅黑褐色，杂有少许白色，基、内线白色，斑点状，前者后方一灰白线外伸至内线，翅后缘至中室有一斜纹，其外侧有二白点，环纹、肾纹白色，外线黑色，外侧衬灰色，在 1 脉前后各一白纹，亚端线不明显，外侧一列白及浅褐色斑；后翅暗褐色，基部色浅，近臀角处杂白色；腹部暗褐色。

分布 四川。

## 布冬夜蛾属 *Bryopolia* Boursin

*Bryopolia* Boursin, 1954, Bull. Soc. Fouad, I. Ent. 38: 86.

Type-species: *Bryomima virescens* Hampson.