

色，波浪形，中线自前缘脉外斜至中室下角，折角内斜，2—4脉基部有隐约的褐斑，外线隐约可见双线褐色，前半稍外弯，自7脉起平稳内斜，亚端线不明显，微现土黄色，缘毛紫红色；后翅淡褐色，外半部带黑褐色，缘毛紫红色；2脉后黄白色；腹部黑褐色，端部褐黄色。

分布 黑龙江、陕西。

双纹焰夜蛾 *Pyrrhia bifasciata* (Staudinger) (图版Ⅶ-14)

Grammesia bifasciata Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. p. 254. (SE Siberia)

Calymnia bifasciata Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 200. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 231, pl. 47i. —Draudt, 1934, ibid. 3 Suppl. p. 189, pl. 22c. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 275, pl. 84, fig. 1961.

Pyrrhia bifasciata: Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. Jap. p. 76. Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 687, pl. 168, figs. 9, 10.

翅展 33 mm。头部与胸部灰褐色，下唇须与足胫节杂有少许黑褐色，后足跗节微带桃红色；前翅污褐带霉绿色，基线粗，灰色，自前缘脉至1脉，内线粗而外弯，灰色，环纹圆形，有微弱的暗褐边，肾纹仅内外缘可见暗褐色，中线暗褐色，前半不清晰，自中室下角后较直内斜，后端与内线相遇，外线粗，灰色，自前缘脉后外伸，至9脉折角内斜，1脉后更斜向内，亚端线隐约可辨，锯齿形，与外线之间暗褐色，端线棕色，内侧灰色，缘毛端半部棕灰色；后翅淡褐色，翅脉黑褐色，横脉纹明显，黑褐色，端区有一黑褐宽带，端线黑色，内侧灰色，缘毛端部灰白色；腹部污褐灰色，毛簇端部灰黑色。

寄主 大麻核桃。

分布 黑龙江、河北；日本，俄罗斯。

绿焰夜蛾 *Pyrrhia stupenda* Draudt (图版Ⅶ-15)

Pyrrhia stupenda Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 122. (德钦、丽江)

翅展 35 mm。头部与胸部红棕色，前足跗节杂有黑色，中、后足跗节褐黄色带红色；前翅红棕色，前缘带有红棕色，布有少许黑褐细点，基线黑色，自前缘脉外弯至亚中褶，内线双线黑色，波曲外斜，不清晰，环纹褐红色，圆形，有不完整的黑边，中央一黑点，中线粗，黑色，在前缘区约呈三角形斑中室后外斜，在1脉折角，肾纹大，黑边，内2/3黑色，外线双线，内一线极细弱，微黑，自前缘脉外斜至5脉折向内斜，外一线棕色，自前缘脉外斜，至4脉后微波浪形内弯，线外侧有一红棕色带，在4脉前约呈三角形，前缘脉上有一列黄白点并间以黑色，亚端线隐约可见间断的黑纹，各翅脉带有黑色，端线由一系列新月形黑纹组成；后翅黑褐色，基部浅黄色，缘毛浅黄色微带红色；腹部褐黄色，背面带褐色。