

*Agrotis subdecora* Staudinger, 1895, *Iris*, 8: 353.

*Euxoa decorans*: Corti, 1931, in Seitz, *Macrolep. World 3 Suppl.* p. 31, pl. 4b. —  
Kozhantschikov, 1937, *Fn. SSSR.* 13: 567, pl. 12, fig. 11.

翅展 34 mm。头部灰色杂黑棕色；胸部褐色；前翅赭褐色，中区微黄，基线、内线及外线均双线黑色，中线不清晰，亚端线褐黄色，与外线之间黑褐色，环、肾纹褐黄边；后翅暗褐色；腹部褐黄色。雄蛾抱器瓣稍窄（图 91）。

分布 新疆；蒙古，中亚地区，俄罗斯。

### 寒切夜蛾 *Euxoa sibirica* (Boisduval) (图版 VIII-10)

*Agrotis sibirica* Boisduval, [1837] 1834, *Icones.* pl. 8c, fig. 6. (未注明模式产地)

*Agrotis sibirica*: Hampson, 1903, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 4: 459.

*Euxoa sibirica*: Corti, 1932, in Seitz, *Macrolep. World 3 Suppl.* p. 38, pl. 5b. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, *Moths Jap.* 1: 688. —Chen, 1982, *Icon. Het. Sin.* 3: 269, pl. 88, fig. 2106.

翅展 38 mm。头、胸暗红褐色；前翅暗红棕色，基线、内线及外线均双线黑色，中线黑色，亚端线浅褐色，内侧色暗，外侧黑色，剑纹窄小，环、肾纹红棕色黑边，后者中央一黑曲纹；后翅灰褐色；腹部暗褐色。

分布 黑龙江、西藏；日本，朝鲜。

## 地夜蛾属 *Agrotis* Ochsenheimer

*Agrotis* Ochsenheimer, 1816, *Schmett. Eur.* 4: 66.

Type-species: *Noctua segetum* [Denis *et* Schiffermüller] by Curtis 1827

*Agronoma* Hübner, [1821] 1816, *Verz. bek. Schmett.* p. 227.

*Scotia* Hübner, [1821] 1816, *Verz. bek. Schmett.* p. 227.

*Noctua* Boisduval, 1829, *Index Meth.* p. 63. (preoccupied)

*Porosagrotis* Smith, 1890, *Bull. U. S. Nat. Mus.* 38: 123.

*Mesembreuxoa* Hampson, 1903, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 4: 137.

喙发达，下唇须斜向上伸，额光滑或有突起，雄蛾触角有线形、锯齿形或双栉形，各足胫节均具刺，前足胫节短于跗基节，雄蛾抱器瓣较窄长，有冠刺；前翅有一副室；后翅 5 脉细弱。

### 种 检 索 表

雄蛾触角双栉形 .....	2
雄蛾触角非双栉形 .....	19