

## 双轮切夜蛾 *Euxoa birivia* (Denis et Schiffermüller) (图版 VII-29)

*Noctua birivia* [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 71. (奥地利)

*Euxoa birivia*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 234. —Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR. 13: 571, text fig. 285. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 295, pl. 88, fig. 2099.

翅展 38 mm。头、胸及前翅暗灰色；前翅有少许褐灰鳞，各横线赭白色，环、肾纹暗灰色，赭白边；后翅白色带浅褐灰色；腹部灰色。雄蛾抱钩稍长，抱器腹长延伸，阳茎有细齿状角状器（图 80）。




图 80 双轮切夜蛾 *Euxoa birivia*  
(Denis et Schiffermüller) ♂ 外生殖器

**分布** 黑龙江、内蒙古、甘肃、新疆；亚洲西部，欧洲。

## 郁切夜蛾 *Euxoa tristis* (Staudinger) (图版 VII-30)

*Agrotis tristis* Staudinger, 1879, Iris, 10: 333. (Aptel Mts)

*Agrotis tristis* var. *varia* Alpheraky, 1889, Mem. Lep. 5: 138.

*Euxoa varia*: Kozhantschikov, 1937, Fn. SSSR 13: 598. —Kovacs et Varga, 1973, Folia ent. Hung. 26 (2): 295. —Chen, 1986, Cutworm agric. reg. China p. 24, text fig. 6.

翅展 32 mm。头、胸暗褐色；前翅褐色，亚前缘脉、中脉及 3、4 脉白色，基线、内线均双线黑色，剑纹长，外方一浅褐条伸达外区，环、肾纹白色黑边，中央暗褐色，外线黑色，亚端线黄白色，内侧一列齿形黑纹，外线与亚端线间浅黄褐色；后翅褐色；腹部暗褐色。雄蛾抱钩较长，阳茎无角状器（图 81）。

**分布** 黑龙江、内蒙古、新疆；中亚地区。