

3. 非洲野猫组 (*occreata* group 或 *lybica* group), 分布于整个非洲和亚洲西南隅。体型略小些, 头部窄, 耳大, 尾长末端细。

沙漠野猫组内包括我国新疆亚种 (*F. s. ornata*)。

### 亚种

#### (1) 新疆亚种 *Felis sivestris ornata* Gray

分布于新疆、甘肃、宁夏等省区。文献载有莎车, 标本采自且末。皮张产地为新疆喀什、吐鲁番, 甘肃酒泉和宁夏等省区。

形态见种的记述。

**分类** 我国新疆亚种的分类问题颇显纷乱。以往记载着新疆莎车的 *Felis shawiana* 和吐鲁番的 *Felis kozlovi* 以及 *Felis caudata* (罗布泊若羌附近、塔里木河)。Pocock (1939) 将 *F. shawiana* 作为丛林猫的同物异名, 以后又作为非洲野猫一亚种 (*F. lybica subsp*) Банников (1954) 将蒙古的类型也订名为 *F. l. shawiana*, 并提及蒙古的标本同塔里木、罗布泊等地所产十分接近, 亦将 *F. kozlovi* 列为 *shawiana* 的同物异名。钱燕文等 (1965) 把原莎车标本和且末标本订名为 *F. lybica shawiana* 合并以上诸异名。

限于目前标本资料缺乏, 暂订为新疆亚种。

#### 44. 漠猫 *Felis bieti* Milne-Edwards (图版九: 图 6)

1892 *Felis bieti* Milne-Edwards, Rev. Gen. des Sci. Pures & Appliquées, 3: 671 (模式产地: 四川康定附近)。

别名: 荒漠猫。

**鉴别特征** 全身无明显条纹, 体背面具有很显著的长峰毛。

**形态** 身长 600—800 毫米, 尾长 230—350 毫米。四足掌面具有褐黑色长毛, 硬而密, 几遮覆足掌面。

毛色: 头部灰白、体背和四肢外侧呈浅黄灰色。背中部略具暗红棕色泽。冬毛, 体背疏落地布满黑色或暗褐色长峰毛, 颇显著, 为本种特点之一。全身无明显条纹, 有时仅臀部外侧有 3—4 条细而不明显的暗横纹。前臂内侧亦有暗纹。

头上, 耳基部淡红褐色, 耳背同体色, 耳尖有短簇毛, 长约 20 毫米。颊部有二斜行暗褐色纹, 二纹间呈亮灰色。腹面暗黄色; 颌白色。仅前胸部淡黄褐。背腹面毛色无明显界限。尾似背色其末端有 3—4 条暗棕色纹, 尾尖端黑色。全身毛都是灰色毛根, 背毛有很长一段为棕黄色, 其上依次为棕黑—黄白—棕黑。

头骨: 脑颅部近圆形, 听泡大而扁平。鼻骨短, 在中部 1/5 处下凹, 其末端上翘。眶间区较宽, 颧骨的前端下弯至泪孔水平之下, 以致上颌骨形成眼眶前壁。上裂齿前端具小而分明的齿尖。

量衡度: (毫米)

产 地	身 长	尾 长
四川康定	711	559
四川松潘	840	356
四川松潘	855	356
四川中部	752	356
四川中部	720	377
四川西北部	834	350
青海大通	690	330
青海大通	787	326
陕西榆林	711	368

产于甘肃岷山的,其头骨标本测量为颅基长 94, 颧宽 74.5, 后头宽 47, 臼齿间宽 41, 后头宽 51.2, 眼眶至吻端长 27 毫米。

**地理分布** 主要分布于我国境内, 计四川青海、甘肃、宁夏和陕西等省区。(分布图 19, 漠猫)

**生态** 对其生活习性所知甚少。本种数量稀少, 栖于多灌木的稀树林, 亦见于 3000 米的高山地区以及荒漠地带。可在雪地活动, 以鼠类为主要食物。

**经济意义** 漠猫是我国猫类特产种, 列为国家保护动物, 目前动物园饲养者极少。

**分类** 对我国漠猫亚种的划分, 目前限于标本、资料不够齐全, 尚有待进一步收集资料, 加以探讨。依文献记载, Allen (1938) 曾合并得自大通的 *Felis pallida*, 记录得自松潘的 *subpallida* 亚种 (*F. p. subpallida*) 和记录于宁夏西北部的 *F. chutuchta* 3 个异名, 后通列为一种, 即漠猫。此后 Pocock (1943) 发表一新亚种, 即陕西亚种 (*F. b. vellerosa*), 同时认为漠猫尚有 2 亚种, 除指名亚种外, 还有宁夏亚种。并对漠猫的 3 个亚种作出检索。

### 漠猫亚种检索

1. 耳背二色, 上半墨黑具长黑簇毛, 四肢部黑色不显著(头骨未见)……………陕西亚种 *F. b. vellerosa*
- 耳背一色, 上半不呈黑色, 四肢黑色显著…………… 2
2. 耳背淡红色与其顶部毛色不一致, 头骨听泡较小, 额部突, 鼻骨部陡斜……………宁夏亚种 *F. b. chutuchta*
- 耳背灰色与头顶毛色相同, 头骨的听泡较大而略扁, 额部不突出, 鼻骨部不陡斜……………
- ……………指名亚种 *F. b. bieti*

#### (1) 指名亚种 *Felis bieti bieti* Milne-Edwards

1892 *Felis bieti* Milne-Edwards, Rev. Gen. des Sci. Pures & Appliquees, 3: 671 (模式产地: 四川康定附近)。

标本采自青海大通、门源、海北, 四川康定、松潘和甘肃南部山地。