

量衡度: (毫米)

产 地	身 长	尾 长
四川康定	711	559
四川松潘	840	356
四川松潘	855	356
四川中部	752	356
四川中部	720	377
四川西北部	834	350
青海大通	690	330
青海大通	787	326
陕西榆林	711	368

产于甘肃岷山的,其头骨标本测量为颅基长 94, 颧宽 74.5, 后头宽 47, 臼齿间宽 41, 后头宽 51.2, 眼眶至吻端长 27 毫米。

**地理分布** 主要分布于我国境内, 计四川青海、甘肃、宁夏和陕西等省区。(分布图 19, 漠猫)

**生态** 对其生活习性所知甚少。本种数量稀少, 栖于多灌木的稀树林, 亦见于 3000 米的高山地区以及荒漠地带。可在雪地活动, 以鼠类为主要食物。

**经济意义** 漠猫是我国猫类特产种, 列为国家保护动物, 目前动物园饲养者极少。

**分类** 对我国漠猫亚种的划分, 目前限于标本、资料不够齐全, 尚有待进一步收集资料, 加以探讨。依文献记载, Allen (1938) 曾合并得自大通的 *Felis pallida*, 记录得自松潘的 *subpallida* 亚种 (*F. p. subpallida*) 和记录于宁夏西北部的 *F. chutuchta* 3 个异名, 后通列为一种, 即漠猫。此后 Pocock (1943) 发表一新亚种, 即陕西亚种 (*F. b. vellerosa*), 同时认为漠猫尚有 2 亚种, 除指名亚种外, 还有宁夏亚种。并对漠猫的 3 个亚种作出检索。


### 漠猫亚种检索

1. 耳背二色, 上半墨黑具长黑簇毛, 四肢部黑色不显著(头骨未见) ..... 陕西亚种 *F. b. vellerosa*
- 耳背一色, 上半不呈黑色, 四肢黑色显著 ..... 2
2. 耳背淡红色与其顶部毛色不一致, 头骨听泡较小, 额部突, 鼻骨部陡斜 ..... 宁夏亚种 *F. b. chutuchta*
- 耳背灰色与头顶毛色相同, 头骨的听泡较大而略扁, 额部不突出, 鼻骨部不陡斜 ..... 指名亚种 *F. b. bieti*

#### (1) 指名亚种 *Felis bieti bieti* Milne-Edwards

1892 *Felis bieti* Milne-Edwards, Rev. Gen. des Sci. Pures & Appliquees, 3: 671 (模式产地: 四川康定附近)。

标本采自青海大通、门源、海北, 四川康定、松潘和甘肃南部山地。



分布图 19 漠猫 *Felis bieti* 宁夏亚种 *F. b. chutuchta* ●  
 陕西亚种 *F. b. vellerosa* ■