

动物园饲养,于5月中旬产仔,一胎5仔。

经济意义 兔狲在自然界中,大量消灭鼠类,有颇大意义。兔狲皮是猫类动物中珍贵皮料,以往作装饰皮,尾亦作装饰用。

亚种 据记载共有3亚种。

里海亚种 *F. m. ferrugineus*, 毛色呈狐红色,背部横纹数量少。

高原亚种 *F. m. nigripectus*, 背部具显著的细横纹。

指名亚种 *F. m. manul*, 体色介于二者之间。

因标本少而不齐全,我国兔狲亚种初步认为有2种。

(1) 高原亚种 *Felis manul nigripectus* Hodgson

1842 *Felis nigripectus* Hodgson, J. Asiatic Soc. Bengal, 11: 276 (模式产地: 西藏)。

分布于西藏、四川、青海和新疆的南疆。

(2) 指名亚种 *Felis manul manul* Pallas

1776 *Felis manul* Pallas, Reise. Russ. Reichs, 3: 692.

1905 *Trichaelurus manul mongolicus* Satunin, Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sci. St. Petersb. 1904, 501. Not of Lesson, 1842.

1907 *Felis manul satuni* Lydekker, Game Animals India, 334.

分布于内蒙古、河北、四川北部和黑龙江省。

47. 云猫 *Felis marmorata* Martin (图版九: 图2)

1837 *Felis marmorata* Martin, Proc. Zool. Soc. London, 1836: 108 (模式产地: 苏门答腊)。

别名: 石猫、石斑猫、小云豹。

鉴别特征 体形略小于家猫,尾长近于身长,具斑驳花纹或大理石斑纹。

形态 身长460—660毫米,尾长450—560毫米。尾形粗圆、尾毛蓬松。四足的各趾均具发达的爪鞘。

毛色: 体背面褐黄、褐灰或赭褐色。腹面灰黄色。自颈背沿中线有两行断续黑纹。体侧有斜行排列的黑缘小斑块。有时模糊或融合,形成黄黑相间的独特体纹。貌似大理石斑即称为石猫。头部、四肢和尾均为黄色上散布黑斑点。耳小而圆,耳背黑色,具一小白斑。瞳孔大,淡褐色,收缩时呈圆形。

头骨: 颅形较高,鼻骨短,前颌骨鼻支并不扩展。颧弓宽,颧骨眶突细长向上与眶后突连接组成眼眶环。眶间区窄。二颧嵴呈弧形,仅老年个体才合并成短的矢状嵴。翼间孔拱状,前缘并非平直,侧缘较厚些。枕骨区较宽。颞乳突间的颅宽,大于颅基长之半。

牙齿: 齿式为: $\frac{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1}{3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 30$ 。第三上门齿显著大于其余门齿。第一上前臼齿

极小。上臼齿较大、呈棱形、横列。