

野冬夜蛾属 *Feralia* Grote

*Feralia* Grote, 1874, Bull. Buff. Soc. Nat. Sci. 2: 6.

Type-species: *Diphthera jocosa* Guenée.

*Momophana* Grote, 1875, Stett. Ent. Zeit. 36: 195.

*Arthroclora* Grote, 1875, ibid. p.197.

喙退化，下唇须短，向上伸，前缘饰长毛，额光滑无突起，复眼小，椭圆形，雄蛾触角双栉形，枝短，雌蛾触角线形，有小鳞丛；头部与胸部被粗毛，前、后胸有小毛簇；腹侧有毛，前翅有一副室；后翅6、7脉共柄，5脉弱。

高野冬夜蛾 *Feralia montana* (Sugi) (图版 XXIV-9)

*Diphtherocoma monatana* Sugi, 1968, Tinea, 7: 117, pl. 19, figs. 2, 5. (日本)

*Feralia montana*: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 725. —Nakamura, 1984, Jap. Het. Jour., 127: 21, fig. 1.




图 435 高野冬夜蛾 *Feralia montana* (Sugi) ♂ 外生殖器

翅展 32mm。头部绿色；胸部及前翅黄绿色，前翅中室基部一黑斑，各横线均黑色，基线间断，中线仅前后端明显，内线波浪形，亚端线锯齿形，剑纹、环纹与肾纹白色，环纹、肾纹有一黑纹连接；后翅黑褐色；腹部暗灰褐色。雄蛾有抱器腹端突（图 435）。

分布 黑龙江；日本。

标本可因保存时间较长而严重褪色，绿色部分可能变为浅绿甚至黄白色。