

螟蛉夜蛾 *Naranga diffusa* (Walker) (图版 XLI-58)

Xanthodes diffusa Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 779. (斯里兰卡)

Naranga ferruginea Moore, 1882, Lep. Atk. p. 134.

Naranga quadrivittata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 134.

Xanthoptera dimorpha Snellen, 1886, Veth's Midden-Sumatra, Lep. p. 45.

Naranga diffusa: Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 359. — Moore, 1884—87, Lep. Ceyl.

3: 49. — Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 333, fig. 177. — Hampson, 1910, Cat.

Lep. Phal. Br. Mus. 10: 631. — Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 296, pl.

26n.

翅展 20—26 mm。头部与胸部褐黄色；前翅基部褐黄色，前缘区基部血红色，一血红色斜带自前缘脉至后缘近基部，其外缘微波曲，另一红血带自前缘脉近中部内斜至翅后缘，其内外缘均微波曲，端区带有血红色，中带与基部血红带之间及外侧黄色，缘毛黄色；后翅暗褐色，缘毛黄色，基部红褐色；腹部褐黄色。

分布 海南；缅甸，印度，斯里兰卡，印度尼西亚。

火夜蛾属 *Flammona* Walker

Flammona Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc. Zool. 7: 55.

Type-species: *Flammona quadrifasciata* Walker.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达额中部，第三节短而较宽饰鳞，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角甚扁；胸部几全被鳞片，无毛簇；腹部无毛簇；前翅顶角较尖，外缘曲度平稳，不成锯齿形，有副室。

三条火夜蛾 *Flammona trilineata* Leech (图版 XLII-1)

Flammona trilineata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 562. (江西九江)

Flammona trilineata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 639. — Warren, 1912, in Seitz, Macrolep. World 3: 283, pl. 52g. — Draudt, 1950, Mitt. munch. ent.

Ges. 40: 140. — Chu *et al.*, 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 80. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 333. — Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 999.

翅展 32 mm。头部与胸部灰色带有淡褐色；前翅褐色微带紫色，布有褐色细点，内线为一棕色窄带，较直，中线为一较宽棕色带，向后渐宽，其外缘较模糊并稍外斜，环纹只现一棕色点，肾纹窄，棕色，前端向前缘区延伸并折向外行，外线棕色，较粗，自前缘脉直线内斜至中褶，折角直线后垂，其内侧衬以白色，外侧衬以模糊褐色，亚端线灰白色；后翅淡灰棕色；腹部灰色带有淡褐色。

分布 湖南、福建、江西、广西、四川。

陵夜蛾属 *Hoplotarache* Hampson

Hoplotarache Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 712.

Type-species: *Tarache minoides* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，额有平截椎形突起，边缘隆脊形，中央一圆突，复眼大，触角线形稍扁；胸部主要被鳞片；前翅有一副室，后翅5脉发达，自中室下角稍前发出，3、4脉自中室下角发出，或共一短柄。

种 检 索 表

前翅前缘区大部白色..... 白缘陵夜蛾 *Hoplotarache binominata*
前翅前缘区大部及后缘区内半白色..... 蒙陵夜蛾 *H. deceptrix*

蒙陵夜蛾 *Hoplotarache deceptrix* Warren (图版XLII-2)

Hoplotarache deceptrix Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 299, pl. 27a. (印度)

Hoplotarache deceptrix: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 333.

翅展 26 mm 左右。头部及胸部乳白色；前翅乳白色，基线为两排褐灰斑组成，内线褐灰色，间断，环纹灰色圆形，肾纹灰色，外围稍黑，中线在前缘区为一黑褐色斜三角形斑，在中室后半为褶纹，其后为黑灰色三角形大斑，与外线融合，肾纹前方的前缘脉上有一黑褐斑，外线双线白色，线间及外侧褐色带暗绿色，锯齿形内斜，在1脉上成较尖齿，亚端线黄白色波浪形，端线为一列黑点，缘毛黄白色，顶角、臀角及5、6脉端各一黑斑；后翅乳白色，端区黑褐色。

分布 广西、云南；印度。

白缘陵夜蛾 *Hoplotarache binominata* (Butler) (图版XLII-3)

Tarache binominata Butler, 1892, Entom. 25: 64. (印度)

Acontia costalis Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 33: 784.

Hoplotarache binocostalis ssp. *inquinata* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 299.

Tarache binominata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 313.

Hoplotarache costalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 714, pl. 170, fig. 27.

翅展 20 mm。头部与颈板白色微带褐色，下唇须浅褐色；胸部背面褐色，下胸与足白色，前足胫节有白斑；前翅褐色，布有灰色细点，前缘区白色，其后缘达中室，外端达亚端线，白色区内带有褐色，内线细弱，褐色，微曲外斜，中室及中室横脉外侧各有一小白斑与白色区相连，外线细弱，褐色，自白色区后行，4脉后内弯，亚端线褐