

有一列黑褐点，缘毛褐灰色；后翅暗褐色，中区有一黑褐带，宽而模糊，外区有一黄白色带，自前缘较直外斜近达臀角，向后渐窄，端区色暗，缘毛暗褐灰色；腹部灰褐色。

寄主 甘草。

分布 新疆；土耳其，欧洲。

符夜蛾属 *Fodina* Guenée

Fodina Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Lep. 7: 274.

Type-species: *Fodina oriolus* Guenée

喙发达，下唇须向上伸，略超过头顶，第三节细长，雄蛾触角线形，有鬃毛；胸部被平滑鳞片；前翅短宽，顶角稍尖，约呈直角。

种 检 索 表

1. 前翅褐色 昆符夜蛾 *Fodina cuneigera*
前翅黑色 2
2. 前翅前缘区 2/3 灰色 白带符夜蛾 *F. stolda*
前翅一色 3
3. 前翅白带宽，后翅 1 脉外半一黑纵纹 符夜蛾 *F. oriolus*
前翅白带窄，后翅基部及亚中褶后黑色 泊符夜蛾 *F. pallula*

昆符夜蛾 *Fodina cuneigera* (Butler) (图版 LXIII-15)

Trigonodes cuneigera Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 79, pl. 132, fig. 5. (印度)

Fodina cuneigera: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 530.

翅展 36 mm。头部深棕色，额下部两侧有灰色斑，两触角间有一微灰横纹，下唇须外侧黑灰色杂少许灰白色；颈板褐黑色，基部褐色，中部有一灰白横纹，胸部背面褐黑色，下胸浅褐黄色，足外侧黑褐色；前翅褐色，有灰黄色感，前缘区暗褐色，基部暗褐扩展至亚中褶，布有黑褐及灰白细点，前缘区外布有黑点，基半部有一黑色三角形大黑斑，其前缘自中室顶角内斜至翅后缘近基部，外缘微曲，后缘达 1 脉，内端向后稍弯，成一钩形，斑的各边均衬以黄白色，近顶角另有一近三角形黑斑，其前缘达 7 脉，外端稍前伸，后端达 4 脉，外缘衬黄白色并有黄白细点，内缘衬黄白细线；后翅黑褐色，缘毛褐色；腹部灰褐色。

分布 海南；印度。

白带符夜蛾 *Fodina stola* Guenée (图版 LXIII-16)

Fodina stola Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Lep. 7: 275. (印度)