

Fodina gloriosa Lucas, 1891, Proc. Linn. Soc. N. S. W. 2, 6: 304.

Fodina postmaculata Hampson, 1893, Ill. Colln Br. Mus. 9: 37, 113.

Fodina stola: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 530. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 373.

翅展 45 mm。头部褐色，头顶在两触角间有一白色横纹，额两侧各有一弧形白纹，下唇须外侧褐灰色，第二节基部灰色；胸部黑褐色，颈板端部、翅基片端及后胸各有一白横纹，下胸杏黄色，足褐色；前翅黑褐色至黑色，前缘区大部紫灰色带褐色并布有黑色细点，一白色条自前缘区后外斜至亚中褶近端部，向后渐窄，后端连一白色短线内斜至翅后缘，白条前端内侧一白线内斜至 1 脉近基部，臀角有一褐灰斑，布有黑点，近翅外缘有一白线；后翅杏黄色，后缘区外端有一模糊黑纵纹，并前弯至亚中褶，端区有一黑条，前宽后窄，后端达 2 脉后，3 脉前的缘毛黑褐色杂灰黄色，3 脉后的缘毛杏黄色杂少许褐色；腹部黄色带褐色。

分布 福建、广东、海南；印度，不丹，斯里兰卡等。

符夜蛾 *Fodina oriolus* Guenée (图版 LXIII-17)

Fodina oriolus Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Lep. 7: 274, pl. 22, fig. 5. (Bengal)

Fodina oriolus: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 529. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 372.

翅展 43 mm。头部黑色，头顶在两触角间有一白色横纹；胸部背面黑色，下胸黄色，足外侧黑褐色杂灰黄色，前足胫节与跗节外侧黑色；前翅黑色，一白带自前缘脉近中部外斜至近臀角，其内外缘微波曲，近翅外缘有一白色线，前端达翅外缘，其外侧杂有细白点，缘毛褐灰色杂灰白色，中段有一模糊黑褐线；后翅橘黄色，端区有一黑色大斑，前宽后窄，后端达 2 脉，其后方在亚中褶处有一近圆形小黑斑，1 脉近端部有一长三角形黑纹，2 脉后可见黑色端线，缘毛前半黑色，后半橘黄色；腹部橘黄色，背毛簇黑色。

分布 海南、云南；孟加拉国，锡金，巴基斯坦。

泊符夜蛾 *Fodina pallula* Guenée (图版 LXIII-18)

Fodina pallula Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Lep. 7: 275. (Bengal)

Fodina pallula: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 530. —Viette, 1951, Bull. Mensuel Soc. Linn. Lyon. 20: 162.

翅展 38—42 mm。头部黑色，头顶在两触角间有一白色横纹，触角基节灰白色，下唇须褐灰色；胸部背面黑色，下胸褐灰色；前翅黑色，一白条纹自前缘脉近中部外斜至翅后缘近臀角，向后渐窄，近翅外缘有一白色，微内弯，前端起自 8 脉并贴近翅外