

*Blepharidia amicina*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 394.

*Euxenistis amicina*: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 140. —Nye, 1975, Lepid. Cat. Noct. 1—2: 205.

*Blepharosis amicina*: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.218.

翅展 35mm。头部与胸部褐色带有黑灰色；前翅暗褐色，中区及端区微黑，外区较灰，基线灰色，两侧衬黑色，自前缘脉外斜至 1 脉，二曲形，内线灰色，两侧衬黑色，波浪形外斜，环纹斜椭圆形，灰色黑边，中有暗褐色环，肾纹色似环纹，稍长，外线灰色，内侧衬黑色，自前缘脉锯齿形外弯，4 脉后内斜，外区前缘脉上有一列灰白点，亚端线三曲形，内方灰色，外方暗褐色，端线黑色，缘毛基部有一褐白线；后翅褐色，端线黑色，缘毛基部有一褐白线；腹部暗褐色，臀毛簇色浅。

分布 青海、西藏。

## 雅冬夜蛾属 *Gaurenopsis* Houlbert

*Gaurenopsis* Houlbert, 1921, Et. Lep. Comp. 18: 232.

Type-species: *Gaurenopsis velutina* Houlbert.

喙发达，下唇须向上伸，第二节饰长毛，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形；胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇；腹基节背面有毛簇；前翅有一副室；后翅 6、7 脉短共柄，5 脉弱。

### 雅冬夜蛾 *Gaurenopsis conspicua* (Leech) (图版 XXVI-10)

*Polia conspicua* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 94. (康定)

*Gaurenopsis velutina* Houlbert, 1921, Et. Lep. 18: 232.

*Blepharidia conspicua*: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 399. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 141.

翅展 38mm。头、胸、前翅黑褐色，杂有少许白色，基、内线白色，斑点状，前者后方一灰白线外伸至内线，翅后缘至中室有一斜纹，其外侧有二白点，环纹、肾纹白色，外线黑色，外侧衬灰色，在 1 脉前后各一白纹，亚端线不明显，外侧一列白及浅褐色斑；后翅暗褐色，基部色浅，近臀角处杂白色；腹部暗褐色。

分布 四川。

## 布冬夜蛾属 *Bryopolia* Boursin

*Bryopolia* Boursin, 1954, Bull. Soc. Fouad, I. Ent. 38: 86.

Type-species: *Bryomima virescens* Hampson.