

鳞混生，无毛簇；腹部基部有微弱的毛簇；前翅顶角稍尖，外缘曲度平稳，不成锯齿形，有稍长的副室。

种 检 索 表

肾纹大，黑色 红褐霜夜蛾 *Gelastocera rubicundula*
 肾纹中常，不清晰 霜夜蛾 *G. exusta*

霜夜蛾 *Gelastocera exusta* Butler (图版 XXXIX-21)

Gelastocera exusta Butler, 1877, Ann. Mag. nat. Hist. 4: 20: 476. (日本)

Gelastocera exusta: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 583. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 299. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 323. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 798.

翅展 29—34 mm。头、胸及前翅红褐色，前翅微带赭黄色，外半带紫色，各横线黑色，外线与亚端线波浪形，环纹为一黑点，肾纹黑色模糊；后翅白色杂红褐色，翅外缘紫红色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣简单，端缘较平，阳茎短小 (图 567)。




图 567 霜夜蛾 *Gelastocera exusta* Butler ♂ 外生殖器

分布 湖北、湖南、海南、四川、西藏；日本。

红褐霜夜蛾 *Gelastocera rubicundula* (Wileman) (图版 XXXIX-22)

Microleon? rubicundula Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 349. (日本)

Gelastocera rubicundula: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 299. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 799.

翅展 30 mm。头部褐色杂有少许黑色及灰白色，头顶深棕色，触角基侧外侧白色，下唇须外侧深棕色杂灰白色；胸部背面棕色，下胸黄白色，前足胫节外侧黑褐色；前翅红褐色，基线黑色模糊，波浪形，自前缘脉至 1 脉，其内方黑褐色，内线黑色，较粗，