

Type-species: *Gerbatha angusta* Butler.

Acronictoides Kozhantschikov, 1950, Fn. SSSR, 12: 10.

喙发达，下唇须向上伸，第三节短，雄蛾触角线形，额光滑，上半部稍隆起；胸部与腹部无毛簇；前翅窄长，外缘斜。

斋夜蛾 *Gerbathodes angusta* (Butler) (图版IV-24)

Gerbatha angusta Butler, 1879, Het. Br. Mus. 3: 24, pl. 42, fig. 2. (日本横浜)

Oligia angusta Butler; Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 369.

Gerbathodes angusta Butler; Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 175, pl. 41b. —
Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. p.
674, pl. 165, figs. 13—4.

翅展 31mm。头、胸与前翅黑褐色杂灰色，翅基片近端部有黑弧纹，前翅基线、内线及中线黑色，剑纹只现一白点，环纹斜圆形，肾纹窄，两纹均黑色，后者边缘微白，较模糊，外线黑色，亚端线黄白色；后翅红褐色，缘毛浅黄；腹部红褐色。

分布 江西；日本。

缘夜蛾属 *Bryophilina* Staudinger

Bryophilina Staudinger, 1892, in Rom. Mem. Lep. 6: 398.

Type-species: *Bryophilina blandula* Staudinger.

喙发达，下唇须斜向前伸，额光滑，复眼大，圆形，触角线形；胸部主要被鳞片，中、后胸有毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉较发达，自中室横脉中部略后发出。

缘夜蛾 *Bryophilina mollicula* (Graeser) (图版IV-25)

Erastria mollicula Graeser, (1889) 1888, Berl. ent. Zeit. 32: 368. (西伯利亚)

Bryophilina blandula Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 398, pl. 5, fig. 11. —Sugi, 1982,
in Inoue et al., Moths Jap. 1L821

Lithacodia blandula: Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 207. —Chen.
1985, Econ. Ins. Fn. China, Lepid. Noct. 4: 122, pl. 12, fig. 246.

翅展 25mm 左右。头部与胸部灰白色，头顶与颈板黄褐色；前翅灰白色，内线内方带暗褐色，内线双线黑褐色，波浪形，微外斜，环纹黑边，其后方有双黑斜纹外伸至中线，中线在中室前褐色，模糊，在中室后双线黑色明显，肾纹黑边，中央有褐纹，外线黑褐色，锯齿形，外弯至 4 脉后内弯，亚端线不清晰，端区大部带暗褐色；后翅褐色。

分布 黑龙江、四川；日本，西伯利亚。