

色，背面带有褐色，基部毛簇黑色。

分布 海南；不丹，印度，缅甸。

黑点皎夜蛾 *Giaura punctata* (Lucas) (图版 XLIII-37)

Sarotricha punctata Lucas, 1890, Proc. Linn. Soc. N. S. W., 4: 1075. (澳大利亚布里斯班)

Symitha punctata: Swinhoe, 1890, Trans. ent. Soc. p. 236. ——Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 356.

Giaura punctata: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 284. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 394, pl. 36i.

翅展 22mm。头部灰棕色杂有黑褐色，下唇须第一节有黑斑，第二及第三节基部黑色；胸部背面灰棕色杂有黑褐色，颈板、翅基片及后胸有双黑斑；前翅浅灰褐色，布有暗褐色细点，近基部有三个黑圆斑，成外斜线排列于前缘脉、中室前及亚中褶，中线褐黑色，自前缘脉微曲内斜，在中脉成尖锐内突齿，在 1 脉成一小内突齿，中线前半的外方有一片褐黑影，约呈斜方形，肾纹为一暗褐影，其后方有一斜圆形黑斑，外线双线褐黑色，内一线弱而不完整，自前缘脉微曲内斜，4 脉后内弯，在亚中褶成一大内突齿，此处外侧有褐黑斑，一黑褐内斜条自顶角至外线前中部，亚端线仅在 7 脉后的各翅脉间现三角形黑点列，翅脉端部各有一扁三角形黑点；后翅浅褐色，向端区色渐暗；腹部背面褐色，基部几节各节间浅黄色，腹面黄白色。

分布 云南、海南；缅甸，锡金，不丹，印度，澳大利亚。

洁夜蛾属 *Ptisciana* Walker

Ptisciana Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 912.

Type-species: *Ptisciana seminivea* Walker.

Argyrothripa Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 380.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，被细鳞，第三节很长，额光滑无突起，上部有毛簇，复眼大，圆形，雄蛾触角线形，有纤毛丛；胸部几全被鳞片，前胸背面微有毛隆，后胸有较大毛簇；前足胫节饰长毛于两侧；前翅前缘稍拱曲，有一窄长副室；后翅 4、5 脉发自中室下角或共柄；腹部基节背面有毛簇。

洁夜蛾 *Ptisciana seminivea* Walker (图版 XLIII-38)

Ptisciana seminivea Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 912. (Sarawak)

Symitha lilacina Moore, 1888, Lep. Atk. p. 289.

Symitha lilacina: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 381.

Ptisciana seminivea: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 286, text fig. 99. ——