

后翅端区一黄色带 荣夜蛾 *G. ornata*

锯线荣夜蛾 *Gloriana dentilinea* (Leech) (图版LVII-1)

Phyllodes dentilinea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 576. (贵州, 湖北长阳)

Miniodes dentilinea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 363.

翅展 100 mm。头部与胸部灰褐色带紫色, 下唇须向前平伸, 外侧黑褐色; 前翅灰褐色, 内线前半内方色黑褐, 外线外方色较灰, 各横线不清晰, 环纹只现一黑褐点, 肾纹由二白斑组成, 前一为长窄条, 外斜, 后一近三角形, 外线隐约可见, 黑褐色, 由波浪形短纹组成, 自前缘脉外斜至 6 脉折角内斜, 前半内方有致密的黑褐短纹, 多为波浪形, 后半内方有稀疏的黑褐短纹, 列成与外线平行的线, 亚端线由一系列黑褐色扁三角形纹组成, 仅在 2—6 脉间明显, 线两侧亦散布黑褐短纹, 翅外缘有一列黑褐纹, 一黑褐线自顶角后内斜伸至肾纹, 在亚端线上微折曲; 后翅褐黑色带紫色, 基部色浅, 亚端线橘红色, 较粗, 强锯齿形, 自 7 脉达亚中褶; 腹部灰褐色。

分布 湖北、福建、贵州。

荣夜蛾 *Gloriana ornata* (Moore) (图版LVII-3)

Phyllodes ornata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 166. (大吉岭)

Miniodes ornata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 556.

翅展 136 mm。头部与胸部褐红色杂少许黑褐色并带紫色, 触角背缘紫黑色, 下唇须第二节外侧大部带紫灰色, 第三节紫黑色, 下胸有暗灰毛, 足外侧紫黑褐色; 前翅橙黄色, 布有黑色波曲细纹, 2—6 脉基半部之间的区域浅黄色, 中室后缘至亚中褶之间带有黑色, 基线双线褐黑色, 粗而模糊, 波浪形, 自前缘脉外斜至 1 脉, 在前缘脉上为一列褐黑点, 内线褐黑色, 不规则波曲, 在前缘脉上有几个褐黑点, 在中室前细锯齿形, 在亚中褶处内凸, 环纹只现一褐黑点, 肾纹由二白斑组成, 前一斑小, 近水滴形, 后一斑大, 约呈三角形但后端内突, 两斑均围以黑边, 一褐黑纵条自前一斑外侧伸至翅外缘近顶角, 外线双线褐黑色, 两线相距甚远, 自前缘脉外斜至 5—6 脉间折向内斜, 两线均粗而微波曲, 亚端线似外线, 但在 6—7 脉间成一外突齿, 顶角及翅端区布有白点, 翅脉纹褐黑色; 后翅褐黑色, 端区有一黄色带, 前宽后窄, 后端达亚中褶, 带的内缘微波浪形, 翅外缘在亚中褶处微凹, 翅前缘有褐灰毛, 外缘毛黑色, 顶角区间以黄色, 其余杂有灰黄色, 端部淡黄色; 腹部背面黑色带紫色, 腹面黄色, 中央带黑褐色, 各节间有黑褐横纹。

分布 云南; 印度, 锡金。