

Icon. Het. Sin. 3: 271.

翅展 40—48 mm。头部黑色；胸部黑棕色；前翅黄色有赤褐细点，基线赤褐色，只达 1 脉，1 脉基部有一白斑，内线赤褐色带黑色，内侧在中室处有一灰黑斑，在 1 脉后有一黑灰条伸达后缘基部，剑纹可见赤褐色边缘，环纹黄色，中央赤褐色，黑边，肾纹黄色，中央有赤褐色窄圈，将肾纹后端分割成两个点，略白，中线赤褐色，前、后端明显，外线双线黑色，内一线明显，前端为一黄斑，亚端线双线棕色，与外线间为黑灰宽带；后翅污褐色；腹部褐灰色。

寄主 玉米。

分布 黑龙江、陕西、四川；日本，俄罗斯，印度。

健构夜蛾 *Gortyna fortis* (Butler) (图版 XXXVI-10)

Ochria fortis Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 83. (日本横滨)

Gortyna fortis: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 749. Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 271.

翅展 35 mm。头部灰褐色；胸部黄色杂红褐色；前翅黄色密布赤褐点，外线外方赤褐色，基线双线红棕色，只达 1 脉，1 脉基部有一白斑，内线双线褐色，自 1 脉起外伸，后方为灰褐纹，剑纹黑褐边，环纹黄色，中央赤褐色，边缘黑褐色，肾纹淡黄色，内缘黑色，直，中央一黑褐内弯弧线，中线前半段黑褐色，外斜，后半段赤褐色，内斜，外线双线黑色，外一线弱，自前缘脉外伸至 8 脉折角，较平稳地外弯，亚端线黄色，不明显，前端外侧一黄斑；后翅淡黄色微带褐色；腹部浅褐黄色。

分布 黑龙江、福建；日本。

楔胸夜蛾属 *Brachyxanthia* Butler

Brachyxanthia Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5 (1): 169.

Type-species: *Brachyxanthia peculiaris* Butler.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘有长毛，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角锯齿形，有细纤毛；胸部毛与鳞片混生，翅基片成一小背脊，前胸有尖三角形毛簇，后胸有双脊形毛簇，胫节有长毛；腹部无毛簇；前翅短宽，顶角尖而拱，外缘中部强烈外弯并呈锯齿形，有副室。

楔胸夜蛾 *Brachyxanthia zelotype* (Lederer) (图版 XXXVI-11)

Xanthia zelotype Lederer, 1853, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. p. 373, pl. 4, fig. 4. (西伯利亚)

Brachyxanthia zelotype: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 50. ——Sugi, 1982,