

洞。洞穴类型较多,通常具两个洞口,当遇到危险时,从另一洞口逃匿。昼伏夜出,除繁殖季节外,一般单独活动。阴天白昼外出活动。

性机警,凶猛,视觉敏锐,听觉稍钝,善于奔走,追捕动物特喜长途跟踪。能泳。善于上树,常在密林间跳窜进行捕食或逃避敌害,在额尔古纳左旗素有“飞熊”之称。

足迹宽大,冬季在薄雪层上行动十分敏捷,足迹颇象幼熊足迹,但由于平时行走缓慢,且前后足迹时常重叠,故两者极易区别。步度较小步距一般约 20 厘米。

食物庞杂,最喜食大型兽屍肉,有时盗食猎人的猎获物。善于跟踪狼和豺狗等猛兽,找寻它们遗弃的剩食。也主动捕食雪下宿夜的马鹿、狍、麝及其它有蹄类,也捕食鼠类和松鸡 (*Totiao*)、黑琴鸡 (*Lyrurus*)、雷鸟等。捕食时,静伏路旁或树上,待动物接近时,采用突然袭击的方法,抱住动物的背颈予以咬杀。

夏季能顺河而下捕食鱼类。很少吃松果和浆果。Смроганов (1962) 曾对 30 个貂熊胃作了食性检查,其结果为(%):

孢子……3.3	梅花鹿……16.7	麝……3.3
山羊……3.3	雷鸟……6.7	兽屍……66.7

叫声“汪一汪”似狐,但声短粗而急。

发情期多在秋季 11 月,雌雄成对活动。翌年 3 月产仔,一胎多为 2—3 只。1967 年春,黑龙江省鄂温克猎手曾见一窝貂熊幼子,共 5 只。幼兽周身毛色浅淡,后体半环状带纹近似白色。哺乳期 3 个月左右。幼兽发育十分迅速,当体重达到 3.5 公斤后,几乎每天体重增加 100 克左右,3—4 个月后,幼兽体重接近成兽。

貂熊的臭腺能散发特殊浓骚气味,尿也特骚。据萨希荣 (1974) 报道,鄂伦春猎民发现貂熊在剩食周围撒尿,骚臭的气味使其它动物不敢近前窃食。当遇到犬群攻击时,貂熊迅速钻进洞内或上树,向犬群撒尿以解重围。

分类 对比采自我国黑龙江省大兴安岭和新疆阿勒泰地区标本,其主要分类特征与欧洲地模标本描述无显著差异,显然,我国境内的貂熊同属指名亚种。

(1) 指名亚种 *Gulo gulo gulo* Linnaeus, 1758

分布见种的记述。

XII. 鼬属 *Mustela* Linnaeus, 1758

1758 *Mustela* Linnaeus, Syst. Nat. 10th ed. I: 45. *Mustela erminea* Linnaeus.

1911 *Colonokus* Satunin, Mitt. Kauk. Mus. 5: 264. *Mustela sibirica* Pallas.

1921 *Plesiogale* Pocock, Proc. Zool. Soc. 805. *Mustela nudipes* Cuvier. Not of Pomel, 1853.

1947 *Pocockictis* Kretzoi, Ann. H. N. Mus. Hung. 40: 285. To replace *Plesiogale* Pocock. *Mustela nudipes* Cuvier.