

2. 前翅亚端区有锯齿形斑 白纹窄蕊夜蛾 *G. nama*
 前翅亚端区无锯齿形斑 黑褐窄翅夜蛾 *G. ochrographa*

暗斑窄蕊夜蛾 *Gyrtona semicarbonalis* Walker (图版 XLIII-27)

Gyrtona semicarbonalis Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 92. (沙捞越)

Lophoptera angusta Pagenstecher, 1900, Zool. 12, Heft. 29: 92.

Gyrtona semicarbnaalis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 210. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 381. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 246.

翅展 24mm。头、胸、腹及前翅黄白色，翅基片后半黑棕色，前翅基部黑斜纹，基线黑色锯齿形，内线、外线均双线黑色，内线内方一黑褐大斑，剑纹仅端部可见黑色，中线黑褐色，肾纹仅内外缘可见，由黑竖鳞组成，后外角外突，外线间断，在 2 脉后为斑纹状，内线另一黑细线，亚端线黄白色，外侧衬黑褐色，锯齿形外弯，端线为一列黑点；后翅灰白带褐色。

分布 海南；马来西亚。

多型种。手头标本为一变异个体。

白纹窄蕊夜蛾 *Gyrtona nama* Swinhoe (图版 XLIII-28)

Gyrtona nama Swinhoe, 1901, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 7: 492. (印度)

Lophoptera acrogramma Turner, 1932, Proc. R. Soc. S. Austr. 56: 177.

Gyrtona nama: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 215. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 282. —Holloway, 1976, Moths Borneo. p. 20.

Lophoptera nama: Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 267.

翅展 30mm。头部白色有黑褐纹，颈板白色，端半部棕色，中部一褐环，翅基片黑褐色；胸部白色，前翅红棕色，部分带铅灰色，基线仅前端现双黑纹，内线、外线均双线黑色，前者波浪形，剑纹与环纹小，由黑竖鳞组成，肾纹只内半现一白纹，外围黑竖鳞环，外半及前后端各一白点，中线黑色，亚端线不显，与外线间有一列衬白的黑点，顶角一白纹，折成钩形，5 脉处一斜方形白纹，各翅脉端有白点；后翅白色半透明，翅脉及端区黑褐色；腹部黄白带褐色。

分布 海南；不丹，印度，大洋洲。

黑褐窄蕊夜蛾 *Gyrtona ochreographa* Hampson (图版 XLIII-29)

Gyrtona ochreographa Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 216, pl. 179, fig. 31.
 (新加坡)

Gyrtona ochreographa: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 382.

翅展 25mm。头部红褐色，触角及下唇须外侧黑色；胸部背面黑色，颈板和翅基片

基部红褐色，下胸与足淡赭黄色，前足前缘黑色，各足跗节黑灰色，各节间有白环；前翅黑褐色，有紫色感，内线双线黑色，微波浪形，剑纹为一黄白点，外侧有黑色竖鳞丛，环纹为一黄白稍尖的点，外侧有黑色竖鳞丛，肾纹白色，中有一褐纹，外围不完整的黑色竖鳞，中线黑色，在中室及亚中褶处外弯，外线双线黑色，线间赭色，微锯齿形，在中褶及4脉后微内弯，外区前缘脉上有二白点，亚端线双线黑色，由黑点组成，两线相距较宽，线内侧均衬赭黄色点，端线由一系列黑点短纹组成，缘毛中有二黑褐细线；后翅白色半透明，翅脉及端区褐黑色；腹部褐色，腹面淡赭黄色。

分布 云南；新加坡。

皮夜蛾亚科 SARROTHRIPINAE

喙多发达，下唇须长，少数种类第三节端部膨大，额光滑，复眼大，无毛，亦无睫毛，触角一般线形，稍扁，少数为栉形；头、胸主要被毛，胸背少有毛簇，少数后胸有大毛胸，足胫节无刺或爪，前足胫节常饰长毛；腹部背面多有毛簇；前翅前缘基部稍拱曲，3、4、5脉自中室下角发出，3、4脉偶有共柄，有一副室，一般很狭长，少数很小或缺如；后翅5脉发达，自中室下角或下角稍前发出。

雄蛾翅缰钩棒状，中室甚至翅上的横线常有竖鳞丛。

幼虫有稀疏的毛，头顶有几排尖锐的突起，体表刚毛极长，有的为短羽形，着生于稍隆起的毛突上，吐丝器细长，胸足跗节内侧刚毛膨大，腹足4对俱全，趾钩单序。

属 检 索 表

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. 前翅有副室 | 2 |
| 前翅无副室 | 15 |
| 2. 后翅无4脉 | 饰皮夜蛾属 <i>Characoma</i> |
| 后翅有4脉 | 3 |
| 3. 前翅副室窄长 | 4 |
| 前翅副室短 | 13 |
| 4. 后翅3、4脉共柄 | 5 |
| 后翅3、4脉不共柄 | 6 |
| 5. 前足胫节两侧有长毛 | 皮夜蛾属 <i>Nycteola</i> |
| 前足胫节无长毛 | 皎夜蛾属 <i>Giaura</i> |
| 6. 后翅4、5脉共柄 | 洁夜蛾属 <i>Ptisciana</i> |
| 后翅4、5脉不共柄 | 7 |
| 7. 后翅3、4脉自横脉近中部发出 | 8 |
| 后翅3、4脉自中室下角发出 | 12 |