

2. 前翅亚端区有锯齿形斑 白纹窄蕊夜蛾 *G. nama*
 前翅亚端区无锯齿形斑 黑褐窄翅夜蛾 *G. ochrographa*

暗斑窄蕊夜蛾 *Gyrtona semicarbonalis* Walker (图版 XLIII-27)

Gyrtona semicarbonalis Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 92. (沙捞越)

Lophoptera angusta Pagenstecher, 1900, Zool. 12, Heft. 29: 92.

Gyrtona semicarbnaalis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 210. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 381. —Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 246.

翅展 24mm。头、胸、腹及前翅黄白色，翅基片后半黑棕色，前翅基部黑斜纹，基线黑色锯齿形，内线、外线均双线黑色，内线内方一黑褐大斑，剑纹仅端部可见黑色，中线黑褐色，肾纹仅内外缘可见，由黑竖鳞组成，后外角外突，外线间断，在 2 脉后为斑纹状，内线另一黑细线，亚端线黄白色，外侧衬黑褐色，锯齿形外弯，端线为一列黑点；后翅灰白带褐色。

分布 海南；马来西亚。

多型种。手头标本为一变异个体。

白纹窄蕊夜蛾 *Gyrtona nama* Swinhoe (图版 XLIII-28)

Gyrtona nama Swinhoe, 1901, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 7: 492. (印度)

Lophoptera acrogramma Turner, 1932, Proc. R. Soc. S. Austr. 56: 177.

Gyrtona nama: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 215. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 282. —Holloway, 1976, Moths Borneo. p. 20.

Lophoptera nama: Holloway, 1985, Malay, Nat. J. 38: 267.

翅展 30mm。头部白色有黑褐纹，颈板白色，端半部棕色，中部一褐环，翅基片黑褐色；胸部白色，前翅红棕色，部分带铅灰色，基线仅前端现双黑纹，内线、外线均双线黑色，前者波浪形，剑纹与环纹小，由黑竖鳞组成，肾纹只内半现一白纹，外围黑竖鳞环，外半及前后端各一白点，中线黑色，亚端线不显，与外线间有一列衬白的黑点，顶角一白纹，折成钩形，5 脉处一斜方形白纹，各翅脉端有白点；后翅白色半透明，翅脉及端区黑褐色；腹部黄白带褐色。

分布 海南；不丹，印度，大洋洲。

黑褐窄蕊夜蛾 *Gyrtona ochreographa* Hampson (图版 XLIII-29)

Gyrtona ochreographa Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 216, pl. 179, fig. 31. (新加坡)

Gyrtona ochreographa: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 382.

翅展 25mm。头部红褐色，触角及下唇须外侧黑色；胸部背面黑色，颈板和翅基片