



图 356 齿斑盗夜蛾 *Hadens dealbata* (Staudinger) ♂ 外生殖器

皎盗夜蛾 *Hadena eximia* (Staudinger) (图版 XIX-9)

Dianthoecia eximia Staudinger, 1895, Iris 8: 319, pl. 6, fig. 7. (青海)

Sideridis eximia: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 444. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 304.

翅展 33mm。头、胸白色杂黑褐色；前翅白色，基部、内区及外区带褐色，基线、中线及亚端线黑色，基线后端外侧一黑斑，内线、外线均双线黑色，剑纹较大，黑褐色，环纹白色，肾纹大，灰白色，黑边，亚端线内侧有黑齿纹，外线与亚端线间色暗；后翅白色带褐色；腹部黄褐色。

分布 青海；印度。

灰盗夜蛾 *Hadena caesia* (Denis et Schiffermüller) (图版 XIX-10)

Noctua caesia [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 82. (奥地利)

Sideridis caesia: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 443. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 304.

翅展 40mm。头、胸褐色杂暗灰色；前翅灰色杂黄褐及黑色，基线、内线黑色波浪形，不清晰，环纹、肾纹黄色，中有暗灰纹，中线灰色，外线黑色锯齿形，外侧衬黄色，亚端线黄色，细锯齿形；后翅褐色带黑灰色。

寄主 麦瓶草属植物的果荚。

分布 西藏；土耳其，欧洲。