

- 前翅中带窄，清晰 2
 2. 前翅中带在中室前折角 赭肾厚角夜蛾 *H. prunosa*
 前翅中带近呈直线内斜 斜线厚角夜蛾 *H. nakatanii*

白点厚角夜蛾 *Hadennia incongruens* (Butler) (图版 LXVII-15)

Bocana incongruens Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 448. (日本横滨)

Nodaria amurensis Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 274.

Bocana incongruens: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 566.

Nodaria incongruens: Staudinger et Rebel, 1901, Cat. Lep. pal. p. 245.

Bertula jutalis amurensis: Bryk, 1949, Ark. Zool. 41, p. 150.

Hadennia incongruens: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 917, figs.




图 683 白点厚角夜蛾 *Hadennia incongruens*
(Butler) ♂ 外生殖器

翅展 32 mm。头部与胸部褐色，雄蛾触角线形，中部几节膨大，下唇须向上弯，远超过头顶，外侧黑褐色；前翅褐色，内线黑褐色，自前缘脉外斜至中室后缘折角内斜，环纹只现一黄白点，肾纹黄白色，极窄，中线黑色模糊，似一宽带，稍内斜，外线黑褐色，自前缘脉外弯，在中褶处稍内凸，4脉后微波浪形内斜，亚端线黑褐色，似一宽带，自顶角内斜，其内缘在6、7脉间稍内弯，外缘在2—7脉间外弯，前端内侧有一黄白点，端线由一系列扁三角形黑点组成；后翅褐色，内区与外区各有一黑褐宽带，两带前端均起自中室，端线黑褐色；腹部暗褐色。雄蛾抱器腹延伸成棘形突，阴茎长，无角状器（图 683）。

分布 湖北；日本。