

赭肾厚角夜蛾 *Hadennia prunosa* Moore (图版 LXVII-16)

Hadennia prunosa Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 237, pl. 177, fig. 8. (斯里兰卡)

Bleptina prunosa: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 45.

Hadennia brunosa [sic]: Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. 1: 481.

翅展 36 mm。头部黑棕色带紫色，雄蛾触角线形，有鬃毛，基节有白斑，下唇须内侧黄白色，外侧黑褐色，第二节紧贴额前缘向上弯；胸部背面黑棕色带紫色，足胫节端部、胫距基部及端部灰白色，跗节各节间有白斑；前翅黑棕色带紫色，内线黑色，中段不显，环纹只现一黄白点，黑边，中线为一宽黑带，自亚前缘脉内斜至翅后缘，肾纹小，黄色黑边，前后端尖，外线黑色，自前缘脉外斜至 5 脉折角内斜，并成一模糊波曲宽带，折角前不明显，一内斜黑纹自顶角至外线，翅外缘有一列黑点，缘毛基部黄白色；后翅黑棕色带紫色，内线为一黑色宽带，横脉纹浅黄色，外线为模糊黑宽带，其外缘中部外凸，亚端线黑色，自前缘外斜至 4 脉折角内斜，翅外缘有一列黑点，缘毛基部黄白色；腹部黑棕色带紫色。

分布 海南；斯里兰卡。

斜线厚角夜蛾 *Hadennia nakatanii* Owada (图版 LXVII-17)

Hadennia nakatanii Owada, 1979, Mem. nat. Sci. Mus. Tokyo 12: 131, figs. 2, 9. (日本)

Hadennia nakatanii: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 918, pl. 224, fig. 35.

翅展 24 mm。头部与胸部褐色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须向上弯，远超过头顶，外侧黑褐色，下胸与足外侧黑褐色；前翅褐色，内线黑褐色，在中室处成一内凸齿，后半内斜，环纹只现一黑褐点，肾纹黄白色，近圆形，中有一黑褐线，中线粗，黑褐色，似一斜带，其内缘较模糊，外线黑褐色，自前缘脉外斜，至 7 脉折向内斜并呈微波浪形，亚端线黑褐色，在顶角处为一近三角形斑，其后较直内斜，内侧较宽黑褐色，似成带状，前端内侧有一黄白色三角形粗点，中线与亚端线之间浅褐黄色，亚端线外侧亦衬浅褐黄色；后翅褐色，内区有一近三角形黑褐斑，基部较模糊，前缘只达中室，外侧有一黑褐色较直的线，其外方浅褐黄色，亚端线黑褐色，中段稍波曲外弯，与浅褐黄区之间成一黑褐宽带，线外方衬浅褐黄色；腹部褐色。

分布 江西、海南；日本。

胸须夜蛾属 *Cidariplura* Butler

Cidariplura Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 449.

Type-species: *Cidariplura gladiata* Butler.