

列尖齿形黑斑，斑内有黄色点，端线为一系列黑点；后翅褐色；腹部暗褐色。

分布 四川、云南、西藏；印度。

间白蓬夜蛾 *Haderonia persimilis* (Draudt) (图版 XVIII-14)

Trichestra persimilis Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 20, pl. 1, figs. 7, 8; pl. 12, fig. 12. (四川巴塘)

Trichestra persimilis: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 79.

翅展 28mm。头、胸暗褐杂白、黑色；前翅褐色杂白色，亚中褶基部一黑纵纹，基线、内线均双线黑色，后者波浪形，剑纹小，褐色，环、肾纹白色，外线黑色锯齿形，亚端线白色波浪形，内侧 4—6 脉间有二黑齿纹，亚中褶处一大黑齿纹，其内方一白纹；后翅浅褐灰色；腹部暗褐色。雄蛾抱器腹延伸成一突，冠分明，抱器背突小 (图 346)。




图 346 间白蓬夜蛾 *Haderonia persimilis* (Draudt)

♂ 外生殖器

分布 四川、西藏。

中华蓬夜蛾 *Haderonia chinensis* (Draudt) (图版 XVIII-15)

Trichestra chinensis Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 19, pl. 1, figs. 3, 4. (云南德钦、丽江)

Trichestra chinensis: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 296.

翅展 34mm。头、胸暗褐杂黑、白色；前翅褐色，布有黑、白细点，基线、内线及外线均双线黑色，后者锯齿形，剑纹大，黑褐色，环、肾纹白色，后者前后端各一黑褐点，2 脉基部一楔形白纹伸至亚端线后端，后者白色；后翅灰褐色；腹部黑褐色。雄蛾抱器背突细小，冠分明 (图 347)。




图 347 中华蓬夜蛾 *Haderonia chinensis* (Draudt) ♂ 外生殖器

分布 山西、四川、云南、西藏。

晦蓬夜蛾 *Haderonia subarschanica* (Staudinger) (图版 XVIII-16)

Hadena (*Haderonia*) *subarschanica* Staudinger, 1895, *Iris*, 8: 320. (青海湖与罗布泊之间地区)

Polia subarschanica: Hampson, 1905, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 5: 62.

Haderonia subarschanica: Warren, 1909, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 69. —Boursin, 1964, *Ver. zool. Staat. Munch.* 8: 26.

翅展 36mm。头、胸暗褐杂灰白色；前翅褐灰色，内线、外线均双线黑褐色，前者波浪形，后者锯齿形，齿尖为白点，基线双线模糊黑褐色，线间白色，后方有一浅黄纹及一黑纹，剑纹短钝，环纹斜，肾纹窄，两纹均白色，中线黑褐色波浪形，亚端线黑褐色锯齿形，外侧衬白色，近臀角有一黑纹，内侧衬白，或内端裂为二齿；后翅褐色，可见微白的波浪形亚端线；腹部褐灰色。

分布 青海、西藏。

污蓬夜蛾 *Haderonia turpis* (Staudinger) (图版 XVIII-17)

Phoebophilus turpis Staudinger, (1900) 1899, *Iris*, 12: 341, pl. 7, fig. 8. (天山)

Hadula turpis: Hampson, 1905, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 5: 245, text fig. 42. —Warren, 1910, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 86, pl. 20f. —Chen, 1982, *Icon. Het. sin.* 3: 302.

翅展 35mm 左右。头部及胸部灰白色带淡褐色，有少许黑点，颈板中部有一黑横线；前翅灰白色带褐色并布有黑点细点，基线双线黑色间断达亚中褶，内线双线黑色波浪形外斜，剑纹黑褐边，环纹圆形，黑边，肾纹大，中有褐纹，不完整黑边，外线不明显，亚端线白色，在 7、3 及 4 脉处成锯齿形，内侧在 3—6 脉间有齿形黑褐纹，外侧色