



图 347 中华蓬夜蛾 *Haderonia chinensis* (Draudt) ♂ 外生殖器

分布 山西、四川、云南、西藏。

晦蓬夜蛾 *Haderonia subarschanica* (Staudinger) (图版 XVIII-16)

*Hadena* (*Haderonia*) *subarschanica* Staudinger, 1895, *Iris*, 8: 320. (青海湖与罗布泊之间地区)

*Polia subarschanica*: Hampson, 1905, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 5: 62.

*Haderonia subarschanica*: Warren, 1909, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 69. —Boursin, 1964, *Ver. zool. Staat. Munch.* 8: 26.

翅展 36mm。头、胸暗褐杂灰白色；前翅褐灰色，内线、外线均双线黑褐色，前者波浪形，后者锯齿形，齿尖为白点，基线双线模糊黑褐色，线间白色，后方有一浅黄纹及一黑纹，剑纹短钝，环纹斜，肾纹窄，两纹均白色，中线黑褐色波浪形，亚端线黑褐色锯齿形，外侧衬白色，近臀角有一黑纹，内侧衬白，或内端裂为二齿；后翅褐色，可见微白的波浪形亚端线；腹部褐灰色。

分布 青海、西藏。

污蓬夜蛾 *Haderonia turpis* (Staudinger) (图版 XVIII-17)

*Phoebophilus turpis* Staudinger, (1900) 1899, *Iris*, 12: 341, pl. 7, fig. 8. (天山)

*Hadula turpis*: Hampson, 1905, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 5: 245, text fig. 42. —Warren, 1910, in Seitz, *Macrolep. World* 3: 86, pl. 20f. —Chen, 1982, *Icon. Het. sin.* 3: 302.

翅展 35mm 左右。头部及胸部灰白色带淡褐色，有少许黑点，颈板中部有一黑横线；前翅灰白色带褐色并布有黑点细点，基线双线黑色间断达亚中褶，内线双线黑色波浪形外斜，剑纹黑褐边，环纹圆形，黑边，肾纹大，中有褐纹，不完整黑边，外线不明显，亚端线白色，在 7、3 及 4 脉处成锯齿形，内侧在 3—6 脉间有齿形黑褐纹，外侧色