



图 347 中华蓬夜蛾 *Haderonia chinensis* (Draudt) ♂外生殖器

**分布** 山西、四川、云南、西藏。

### 晦蓬夜蛾 *Haderonia subarschanica* (Staudinger) (图版 XVIII-16)

*Hadena (Haderonia) subarschanica* Staudinger, 1895, Iris, 8: 320. (青海湖与罗布泊之间地区)

*Polia subarschanica*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 62.

*Haderonia subarschanica*: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 69. ——Boursin, 1964, Ver. zool. Staat. Munch. 8: 26.

翅展 36mm。头、胸暗褐杂灰白色；前翅褐灰色，内线、外线均双线黑褐色，前者波浪形，后者锯齿形，齿尖为白点，基线双线模糊黑褐色，线间白色，后方有一浅黄纹及一黑纹，剑纹短钝，环纹斜，肾纹窄，两纹均白色，中线黑褐色波浪形，亚端线黑褐色锯齿形，外侧衬白色，近臀角有一黑纹，内侧衬白，或内端裂为二齿；后翅褐色，可见微白的波浪形亚端线；腹部褐灰色。

**分布** 青海、西藏。

### 污蓬夜蛾 *Haderonia turpis* (Staudinger) (图版 XVIII-17)

*Phoebophilus turpis* Staudinger, (1900) 1899, Iris, 12: 341, pl. 7, fig. 8. (天山)

*Hadula turpis*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 245, text fig. 42. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 86, pl. 20f. ——Chen, 1982, Icon. Het. sin. 3: 302.

翅展 35mm 左右。头部及胸部灰白色带淡褐色，有少许黑点，颈板中部有一黑横线；前翅灰白色带褐色并布有黑点细点，基线双线黑色间断达亚中褶，内线双线黑色波浪形外斜，剑纹黑褐边，环纹圆形，黑边，肾纹大，中有褐纹，不完整黑边，外线不明显，亚端线白色，在 7、3 及 4 脉处成锯齿形，内侧在 3—6 脉间有齿形黑褐纹，外侧色

暗，端线为一列黑点；后翅淡褐色；腹部灰白色。

分布 新疆。

### 棕翅蓬夜蛾 *Haderonia praecipua* (Staudinger) (图版 XVIII-18)

*Mamestra praecipua* Staudinger, 1895, Iris, 8: 316. (青海湖与罗布泊之间)

*Hadula praecipua*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 246. — Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 86. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 303. — Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 185.

*Haderonia praecipua*: Boursin, 1964, Ver, zool. Staat. Munch. 8: 25.

翅展 50mm 左右。头部及胸部深棕色；前翅棕色，亚中褶基部有一黑边的楔形纹，内线黑色锯齿形，剑纹大，黑边，环纹大，斜椭圆形，黑边，肾纹大，后端内凸，前端微尖，大部黑棕色，黑边，外线黑色锯齿形，齿尖为黑点，亚端线淡褐色，内侧有一列锯齿形黑纹，4—6 脉间的二齿纹最大，外侧有一列黑纹，端线为一列新月形黑点，缘毛锯齿形；后翅褐色。

分布 青海、山西、四川、云南、西藏。

### 灰蓬夜蛾 *Haderonia griseifusa* (Draudt) (图版 XVIII-19)

*Polia griseifusa* Draudt, 1950, Mitt. Munch. ent. Ges. 40: 30, pl. 2, fig. 14. (云南德钦、丽江，四川巴塘)

翅展 38mm。头、胸及前翅灰色杂黑色，颈板有二黑线，前翅基、内线均双线黑色，双线间杂有灰白色，内线波浪形，剑纹褐色，环、肾纹灰白色，前者斜圆形，中线、外线黑褐色，后者双线，中、外线间有一微白斜方形斑，位于 1—2 脉间，亚端线灰白色，两侧衬黑褐色，在 3、4 脉处锯齿形近达外缘；后翅褐灰色，近臀角有一微白纹；腹部灰褐色。

分布 云南、四川。

## 延夜蛾属 *Hecatera* Guenée

*Hecatera* Guenée, 1852, Hist. Natur. Ins. (Noct.) 2: 27.

Type-species: *Noctua dysodea* [Denis et Schiffermüller].

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘饰长毛，第三节短，额光滑无突起，复眼大，圆形，头、胸主要被鳞片；前胸有散开型毛簇；腹背有一列毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉弱。

雄蛾抱器瓣端分化为横向长宽的冠。