

形，大部黑褐色，中央有白纹，边缘有白色及黄褐色点，外线由一系列白点组成，各翅脉间隐约有细黑褐纹，4脉后内弯，亚端线由一系列不明显的白点组成，端线由一系列黑点组成；后翅暗灰褐色，端线细，黑褐色，缘毛基部有一灰白线，端部灰红色；腹部暗灰褐色。

分布 西藏；印度等。

中赫夜蛾 *Hadjina chinensis* (Wallengren) (图版XXXV-46)

Perigea chinensis Wallengren, 1860, Wien. ent. Mon. 4: 169. (中国)

Segetia mandarina Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 482.

Amyna pulverea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 114.

Hadjina chinensis; Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 525. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 221. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 348. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 783.

翅展 29 mm。头、胸灰色杂紫褐色；前翅紫褐色，基线、内线及外线均黑褐色，基、内线波浪形，外线外侧衬细白点，在各翅脉上另有暗褐和白点，环纹小，中凹，褐色有白环，肾纹褐色有白环，中央有细黑点丛，后端内突，亚端线白色不清晰，内侧衬深褐色；后翅浅褐色，端区较暗；腹部灰褐色。

分布 黑龙江、河北、江西、四川；日本，朝鲜，印度，克什米尔地区。

蛮夜蛾属 *Celaena* Stephens

Celaena Stephens, 1829, (Nom.) Brit. Ins. p. 41.

Type-species: *Apamea harworthii* Curtis.

Helotropha Lederer, 1857, Noct. Eur. p. 118.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额之中部，第三节短，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角线形或双栉形；胸部主要被鳞片，前、后胸有散开型毛簇；前翅有一副室；后翅5脉弱，自中室横脉中部发出；腹部基部几节有毛簇。

白纹蛮夜蛾 *Celaena leucostigma* (Hübner) (图版XXXV-47)

Noctua leucostigma Hübner, 1808, Samml. eur. Schmett. 4: pl. 80, fig. 325. (欧洲)

Gortyna leucostigma: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 24.

Celaena leucostigma: Forster et Wollfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 149.

Helotropha leucostigma: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 270.

翅展 40 mm。头、胸及前翅红褐色，前翅基线、内线及外线均双线褐色，内线波浪形，外线锯齿形，外侧翅脉上有褐、白点，环纹黄白色褐边，肾纹暗褐色，中央浅黄