

缘中部，外侧衬黄色，在6—7脉间与一自前缘脉外斜的曲纹相遇，亚端区有极模糊的暗褐曲纹，翅外缘有一列黑点；后翅色同前翅，横脉纹黑褐色，翅中部有一黑褐色内斜直线，其外侧衬黄色，亚端区有二暗褐色波浪形线，翅外缘有一列黑点。

分布 福建、四川。

哈夜蛾 *Hamodes propitia* (Boisduval) (图版 LXII-9)

Ophiusa propitia Boisduval, 1832, Voy. Astrolabe. Lep. p. 244. (新爱尔兰岛)

Hamodes aurantiaca Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 203.

Ophisma attaccicola Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1383.

Hypernaria discistriga Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 78.

Hamodes marginata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 169.

Hamodes aurantiaca: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 548.

Hamodes propitia: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 38.

翅展 61 mm。全体浅黄色，头顶杂有黑褐色，额上部有一“V”形纹，下部两侧有黑纹，下唇须外侧浅褐色，前足胫节与跗节灰褐色，中、后足胫节外侧杂有黑褐色，中足跗节灰褐色；前翅布有零星黑褐细点，环纹只现一黑点，肾纹仅在中室下角现一约呈三角形黑纹，其前方的前缘区有一模糊黑褐斑，其外方另有二微弱黑褐斑，顶角后有一隐约褐纵条，亚端线黄色外侧衬暗褐色，自顶角微曲内斜，前半外方带有褐色，成模糊斑纹，后半外侧有隐约褐线，缘毛褐色，翅前缘外半稍拱曲，顶角强外突；后翅前缘区及端区散布黑褐细点，外线黄色，较直，亚端线由黑褐细点丛组成，较宽，微波曲，隐约可辨。

分布 海南；缅甸，锡金，印度，菲律宾等。

斜线哈夜蛾 *Hamodes butleri* (Leech) (图版 LXII-10)

Thermesia? butleri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 570. (峨眉山, Chow-pin-sa, Kei-chow)

Hamodes butleri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 380. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 167. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 370.

翅展 44—54 mm。头部灰棕色，额黑色，下唇须第一节及第二节基部外侧白色，后者约呈三角形，其余黑色，第二节背、腹端饰毛；胸部灰棕色；前翅黄褐色，基部色较暗，内线黑色，不清晰，自前缘脉外斜至中室折向内斜，环纹只现一黑点，肾纹大，灰色黑边，前方有一暗棕色纹至前缘脉，外线不明显，仅在前缘脉处现一黑纹，亚端线黑棕色，自顶角直线内斜至翅后缘，线内侧衬红褐色；后翅黄褐色，前缘区淡黄色，一棕色线自前缘区后内斜至翅后缘，线内侧衬红褐色；腹部黄褐色，有黑点。

分布 湖南、福建、海南、四川、云南、贵州。